

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH**

**Torebka z folii polipropylenowej**

**1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

LIŚĆ SENESU

**2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

**3. TERMIN WAŻNOŚCI**

TERMIN WAŻNOŚCI:

**4. NUMER SERII**

NR SERII:

**5. INNE**

20 g  
50 g  
100 g

## INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

### TEKTUROWE PUDEŁKO

#### 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

LIŚĆ SENESU, 25-30 mg glikozydów hydroksyantracenowych w przeliczeniu na sennozyd B/1 g, zioła do zaparzania  
*Sennae foliolum*

#### 2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

**Skład:** 1 g leku zawiera 1 g *Cassia senna* L. (*C. acutifolia* Delile) lub *Cassia angustifolia* Vahl, *foliolum* (listek senesu).  
Jedna łyżka miarowa zawiera 1 g leku, co odpowiada 25-30 mg glikozydów hydroksyantracenowych w przeliczeniu na sennozyd B.

#### 3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

#### 4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

zioła do zaparzania

<b>Zawartość opakowania:</b>	20 g	Kod: 5909990029464
	50 g	Kod: 5909990029471
	100 g	Kod: 5909990029488

Do opakowania dołączona jest łyżka miarowa.

#### 5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

##### Sposób i droga podania:

Podanie doustne.

Maksymalna dawka dobową glikozydów hydroksyantracenowych wynosi 30 mg. Jest to dawka równoważna około 1 g listka senesu, co odpowiada 1 łyżce miarowej leku (około 200 ml naparu).

##### Młodzież w wieku powyżej 12 lat, dorośli, pacjenci w podeszłym wieku

Należy stosować raz na dobę, wieczorem.

Właściwą dawką indywidualną jest najniższa dawka niezbędna do uzyskania miękkiego stolca.

1 łyżkę miarową (1 g) listków senesu zalać szklanką (około 200 ml) gorącej wody, naparzać pod przykryciem przez około 10 min i przecedzić. Wypić jednorazowo od około ½ do całej szklanki ciepłego naparu wieczorem przed snem. Wypróżnienie następuje zazwyczaj po upływie 8-12 godzin. Zwykle wystarczające jest stosowanie leku od 2 do 3 razy w tygodniu.

Stosować zawsze świeżo przygotowany napar.

Zwykle wystarczy przyjmować ten lek 2-3 razy w ciągu tygodnia. Nie należy stosować tego leku dłużej niż przez 1 tydzień.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Jeśli objawy utrzymują się podczas stosowania leku, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

**6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI**

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

**7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE**

**8. TERMIN WAŻNOŚCI**

Termin ważności:

**9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA**

**Przechowywanie:**

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 30°C. Chronić od światła, wilgoci i wpływu obcych zapachów.

**10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**

**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

**Podmiot odpowiedzialny:**

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.  
ul. Pełplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

**12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

Pozwolenie nr 19396

**13. NUMER SERII**

Nr serii:

**14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI**

**OTC - Lek wydawany bez recepty.**

**15. INSTRUKCJA UŻYCIA**

Lek przeczyszczający.

**Wskazania:**

Do krótkotrwałego stosowania w zaparciach występujących sporadycznie.

**16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A**

liść senesu

**17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D**

Nie dotyczy.

**18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA**

Nie dotyczy.