

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH**

**Blister**

**1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

**MODAFEN EXTRA GRIP**

200 mg + 30 mg, tabletki powlekane

*Ibuprofenum + Pseudoephedrini hydrochloridum*

**2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

Sanofi ((logo))

**3. TERMIN WAŻNOŚCI**

EXP:

**4. NUMER SERII**

Lot:

**5. INNE**

**INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH**  
**Pudélko tekturowe**

**1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

**MODAFEN EXTRA GRIP**

200 mg + 30 mg, tabletki powlekane

*Ibuprofenum + Pseudoephedrini hydrochloridum*

**2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH**

Jedna tabletki powlekana zawiera 200 mg ibuprofenu oraz 30 mg chlorowodoru pseudoefedryny.

**3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH**

Lek zawiera laktozę.

**4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

12 tabletek powlekanych kod EAN: 5909990960330

24 tabletki powlekane kod EAN: 5909990960347

**5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA**

Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

**6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO  
W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI**

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

**7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE**

**8. TERMIN WAŻNOŚCI**

EXP = Termin ważności

EXP:

**9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA**

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C, w oryginalnym opakowaniu.

**10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO  
PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI  
WŁAŚCIWE**

**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

*Podmiot odpowiedzialny:*  
Sanofi-Aventis Sp. z o.o.  
ul. Bonifraterska 17  
00-203 Warszawa

{logo Sanofi}

**12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

Pozwolenie nr: 9603.

**13. NUMER SERII**

Lot = Numer serii

Lot:

**14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI**

OTC - lek wydawany bez recepty.

**15. INSTRUKCJA UŻYCIA**

Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwgorączkowo. Udrożnia nos i zatoki.

Łagodzi objawy grypy i przeziębienia.

- gorączka
- ból głowy
- niedrożność nosa (katar) i zatok
- ból stawów i mięśni

Dawkowanie

Dorośli oraz młodzież w wieku 12 lat i powyżej: dawka początkowa to 2 tabletki, następnie, w przypadku konieczności 1 do 2 tabletek co 4 do 6 godzin. Maksymalna dawka dobową to 6 tabletek.

**16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE`A**

Modafen Extra Grip

**17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D**

Nie dotyczy

**18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA**

Nie dotyczy