

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

Etykieta na butelkę

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

APAP

500 mg, tabletki powlekane

Paracetamolum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Skład 1 tabletki powlekanej zawiera: *substancję czynną*: 500 mg paracetamolu

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

oraz substancje pomocnicze.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

tabletki powlekane

50 tabletek powlekanych

60 tabletek powlekanych

100 tabletek powlekanych

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doustne. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Ostrzeżenia

Lek zawiera paracetamol. Nie stosować razem z innymi lekami zawierającymi paracetamol. W razie przedawkowania należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, nawet gdy nie występują objawy.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności:

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywanie Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny

US Pharmacia Sp. z o.o.

ul. Ziębicka 40, 50-507 Wrocław

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**13. NUMER SERII**

Numer serii:

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI**15. INSTRUKCJA UŻYCIA**

bóle:

głowy, w tym napięciowe bóle głowy

miesiączkowe

zębów

mięśni

kostno-stawowe

gardła

nerwobóle

gorączka w przeziębieniu i grypie

LEK PRZECIWBÓLOWY, PRZECIWGORĄCZKOWY

Dawkowanie i droga podania**16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A**

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

Pudełko tekturowe na blistry oraz butelki po 50, 60 i 100 tabletek powlekanych

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

APAP

500 mg, tabletki powlekane

Paracetamolum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Skład 1 tabletki powlekane zawiera: *substancję czynną*: 500 mg paracetamolu

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

oraz substancje pomocnicze.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

tabletki powlekane

2 tabletki powlekane	kod: 5907377139348
4 tabletki powlekane	kod: 5909990764235
6 tabletek powlekanych	kod: 5909990296026
8 tabletek powlekanych	kod: 5909990610082
10 tabletek powlekanych	kod: 5909990610099
12 tabletek powlekanych	kod: 5909990296033
24 tabletki powlekane	kod: 5909990296040
50 tabletek powlekanych	kod: 5909990296057
60 tabletek powlekanych	kod: 5903031286694
100 tabletek powlekanych	kod: 5909990664559

5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA

Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Ostrzeżenia

Lek zawiera paracetamol. Nie stosować razem z innymi lekami zawierającymi paracetamol. W razie przedawkowania należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, nawet gdy nie występują objawy.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności:

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywanie Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny

US Pharmacia Sp. z o.o.,
ul. Ziębicka 40,
50-507 Wrocław
{logotyp podmiotu}

12. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/2960

13. NUMER SERII

Numer serii:

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Wskazania

bóle:
głowy, w tym napięciowe bóle głowy
miesiączkowe
zębów
mięśni
kostno-stawowe
gardła
nerwobóle
gorączka w przeziębieniu i grypie

LEK PRZECIWBÓLOWY, PRZECIWGORĄCZKOWY

Dawkowanie i droga podania

Dorośli:

pojedyncza dawka: 1-2 tabletki powlekane (500-1000 mg paracetamolu), w razie konieczności 3 do 4 razy na dobę;

maksymalna dawka dobową: 8 tabletek powlekanych (4 g paracetamolu).

Młodzież w wieku powyżej 12 lat:

pojedyncza dawka: 1 tabletka powlekana (500 mg paracetamolu), w razie konieczności 3 do 4 razy na dobę;

maksymalna dawka dobową: 4 tabletki powlekane (2 g paracetamolu).

Należy przestrzegać co najmniej 4 godzinnego odstępu między kolejnymi dawkami.

Bez konsultacji z lekarzem nie należy stosować leku, jeśli ból utrzymuje się dłużej niż 5 dni, a gorączka dłużej niż 3 dni.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

Apap 500 mg