

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

PUDEŁKO TEKTUROWE

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

APAP intense

200 mg + 500 mg, tabletki powlekane

Ibuprofenum + Paracetamolum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Skład

Każda tabletki powlekana zawiera 200 mg ibuprofenu i 500 mg paracetamolu.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Tabletka powlekana

4 tabletki powlekane

6 tabletek powlekanych

8 tabletek powlekanych

10 tabletek powlekanych

12 tabletek powlekanych

16 tabletek powlekanych

20 tabletek powlekanych

24 tabletki powlekane

32 tabletki powlekane

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Sposób stosowania i droga podania

Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Przechowywanie

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP):

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny:

US Pharmacia Sp. z o.o., ul. Ziębicka 40, 50-507 Wrocław

{logotyp podmiotu odpowiedzialnego}

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr:

13. NUMER SERII

Numer serii (Lot):

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC – Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Wskazania

Krótkotrwałe leczenie łagodnych do umiarkowanych bólów: związanych z migreną, głowy, pleców, menstruacyjnych, zęba, reumatycznych, mięśniowych, związanych z łagodnym zapaleniem stawów, gardła, objawy przeziębienia i grypy, gorączka. Lek odpowiedni do leczenia bólu wymagającego silniejszego działania przeciwbólowego niż ibuprofen lub paracetamol stosowane oddzielnie.

Dorośli w wieku od 18 lat: Należy przyjmować 1 tabletkę (lub 2, jeśli to konieczne) **podczas posiłku, popijając wodą**, nie częściej niż 3 razy na dobę. Należy zachować **co najmniej 6 godzinną przerwę między kolejnymi dawkami** i nie należy przyjmować więcej niż 6 tabletek w ciągu 24 godzin.

Nie stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Nie stosować przez okres dłuższy niż 3 dni. W przypadku utrzymywania się lub nasilenia objawów, należy skonsultować się z lekarzem.

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią ulotki załączonej do opakowania.

Ostrzeżenia

Zawiera paracetamol.

Nie stosować jednocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol. W razie przedawkowania należy natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej, nawet jeśli pacjent czuje się dobrze.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Apap intense

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.