

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH**TEKTUROWE PUDEŁKO****1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

Nurofen Ultima
Ibuprofenum + Paracetamolum
200 mg + 500 mg, tabletki powlekane

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każda tabletki powlekana zawiera 200 mg ibuprofenu i 500 mg paracetamolu.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH**4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

Tabletki powlekane

6 tabletek powlekanych	numer GTIN
8 tabletek powlekanych	numer GTIN
10 tabletek powlekanych	numer GTIN
12 tabletek powlekanych	numer GTIN
16 tabletek powlekanych	numer GTIN
20 tabletek powlekanych	numer GTIN
24 tabletki powlekane	numer GTIN
32 tabletki powlekane	numer GTIN

5	9	0	9	9	9	0	8	2	5	7	7	6
5	9	0	9	9	9	0	8	2	5	7	8	3
5	9	0	9	9	9	0	8	2	5	7	9	0
5	9	0	9	9	9	0	8	2	5	8	0	6
5	9	0	9	9	9	0	8	2	5	8	3	7
5	9	0	9	9	9	0	8	2	5	8	4	4
5	9	0	9	9	9	0	8	2	5	8	5	1
5	9	0	9	9	9	0	8	2	5	8	6	8

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Nie należy przekraczać zalecanej dawki.
Do stosowania doustnego.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE**8. TERMIN WAŻNOŚCI**

Termin ważności (EXP):

9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA
--

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE
--

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO
--

Reckitt Benckiser (Poland) S.A.,
ul. Okunin 1,
05 – 100 Nowy Dwór Mazowiecki

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 17559

13. NUMER SERII

Numer serii (Lot):

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC – Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Do podawania doustnego i krótkotrwałego stosowania.

1 tabletka (w razie konieczności 2) do 3 razy na dobę z posiłkiem.

Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Nie przyjmować więcej niż 6 tabletek w ciągu 24 godzin, zachować co najmniej 6 godzinną przerwę między dawkami.

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 18 lat.

Nie stosować dłużej niż przez 3 dni.

Jeśli objawy utrzymują się lub gdy ulegną nasileniu, należy skontaktować się z lekarzem.

NIE STOSOWAĆ LEKU NUROFEN ULTIMA, JEŚLI:

- kiedykolwiek występowało owrzodzenie żołądka, perforacja lub krwawienie
- występuje alergia na ibuprofen, paracetamol lub którykolwiek inny składnik tego leku
- występuje alergia na kwas acetylosalicylowy (aspirynę) lub inne podobne leki przeciwbólowe (NLPZ)

- przyjmowane są inne leki przeciwbólowe z grupy NLPZ (np. zawierające ibuprofen) lub kwas acetylosalicylowy w dawce powyżej 75 mg na dobę

Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:

- aktualnie lub w przeszłości występowała astma, cukrzyca, zwiększone stężenie cholesterolu, wysokie ciśnienie krwi, udar, zaburzenia czynności serca, wątroby, nerek lub jelit
- pacjent pali tytoń
- pacjentka jest w ciąży

LEK ZAWIERA PARACETAMOL. Nie stosować z innymi lekami zawierającymi paracetamol. Nie przekraczać zalecanej dawki. W przypadku przedawkowania należy zasięgnąć porady lekarskiej, nawet jeśli pacjent czuje się dobrze. Należy zapoznać się z załączoną ulotką.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Nurofen Ultima

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

BLISTER

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Nurofen Ultima
200 mg + 500 mg, tabletki powlekane
Ibuprofenum + Paracetamolum

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP

4. NUMER SERII

Lot

5. INNE