

## INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

Pudełko tekturowe

### 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

OXYCORT, (9,30 mg + 3,10 mg)/g, aerozol na skórę, zawiesina  
*Oxytetracyclini hydrochloridum + Hydrocortisonum*

### 2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

1 g zawiesiny zawiera 9,30 mg oksytetracykliny chlorowodoru i 3,10 mg hydrokortyzonu.

### 3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Substancje pomocnicze: sorbitanu trioleinian, lecytyna, izopropylu mirystynian, mieszanina propanu, butanu, izobutanu

### 4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Aerozol na skórę, zawiesina

16,125 g

Kod EAN: 5909990303618

32,25 g

Kod EAN: 5909990303625

### 5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie na skórę

**Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.**

***Przed każdym użyciem energicznie wstrząsnąć pojemnik.***

### 6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

### 7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

- Skrajnie łatwopalny aerozol
- Pojemnik pod ciśnieniem. Ogrzanie grozi wybuchem.  
{Piktogram oznakowania substancji łatwopalnych} NIEBEZPIECZEŃSTWO
- Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia, otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie zabronione.
- Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
- Pojemnik pod ciśnieniem. Nie przekłuwać, ani nie spalać, nawet po zużyciu.
- Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/ 122°F.

**8. TERMIN WAŻNOŚCI**

Termin ważności (EXP):

**9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA**

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

**10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁĄŚCIWE****11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

{Logo} POLFA TARCHOMIN S.A.  
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Spółka Akcyjna  
ul. A. Fleminga 2  
03-176 Warszawa

**12. NUMER (NUMERY) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

Pozwolenie nr R/3036

**13. NUMER SERII**

Nr serii (Lot):

**14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI**

Rp. - Lek wydawany na receptę.

**15. INSTRUKCJA UŻYCIA****16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A**

oxycort (9,30 mg + 3,10 mg)/g

**17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D**

Obejmuje kod 2D, będący nośnikiem niepowtarzalnego identyfikatora.

**18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA**

PC: {numer}

SN: {numer}

NN: {numer}

## INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

Pojemnik

### 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

OXYCORT, (9,30 mg + 3,10 mg)/g, aerozol na skórę, zawiesina  
*Oxytetracyclini hydrochloridum + Hydrocortisonum*

### 2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

1 g zawiesiny zawiera 9,30 mg oksytetracykliny chlorowodoru i 3,10 mg hydrokortyzonu.

### 3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Substancje pomocnicze: patrz ulotka

### 4. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

16,125 g

32,25 g

### 5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie na skórę

### 6. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

- Skrajnie łatwopalny aerozol
- Pojemnik pod ciśnieniem. Ogrzanie grozi wybuchem.  
{Piktogram oznakowania substancji łatwopalnych} NIEBEZPIECZEŃSTWO
- Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia, otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie zabronione.
- Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
- Pojemnik pod ciśnieniem. Nie przekłuwać, ani nie spalać, nawet po zużyciu.
- Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F.

### 7. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP {na spodzie pojemnika}

### 8. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

**9. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

{Logo} POLFA TARCHOMIN S.A.

**10. NUMER SERII**

Lot {na spodzie pojemnika}

**11. INNE**

*Przed każdym użyciem energicznie wstrząsnąć pojemnik.*