

Oznakowanie opakowania bezpośredniego
(butelka z polietylenu z kroplomierzem i z zakretką z pierścieniem gwarancyjnym
z polietylenu)

Płyn Burowa COEL

Aluminii subacetatis solutio, 8,5 g/100 g

Płyn na skórę,

50 g

Skład. Płyn Burowa przygotowany jest zgodnie z recepturą Farmakopei Polskiej;

Płyn zawiera substancje czynne: siarczanu glinu,, wapnia węgla, kwasu octowego lodowatego (311g/l), substancja pomocnicza – woda oczyszczona.

Działanie. Ściągające i zmniejszające obrzęk spowodowany stanem zapalnym.

Wskazania do stosowania.

Stosować na skórę bez przerwanej ciągłości w stłuczeniach i obrzękach zapalnych tkanek miękkich.

Przeciwwskazania.

Nie stosować w obrębie twarzy, błon śluzowych i na otwarte rany oraz w nadwrażliwości na którykolwiek ze składników leku.

Środki ostrożności.

Unikać kontaktu płynu z oczami i błonami śluzowymi. Nie stosować w opatrunku zamkniętym. Nie stosować na duże powierzchnie ciała.

Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji.

Brak danych.

Stosowanie w czasie ciąży i karmienia.

Brak danych. Przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem.

Sposób stosowania i droga podania.

Lek stosuje się zewnętrznie na skórę. Należy 1 lub 2 łyżki stołowe preparatu rozcieńczyć w szklance wody. Świeżo przygotowanym roztworem nasączyć okład, przyłożyć na obrzęknięte miejsca, pozostawić do wyschnięcia. Stosować 1-3 razy dziennie przez okres nie dłuższy niż 3 dni.

Działania niepożądane.

Wielokrotne użycie na skórę u osób wrażliwych może spowodować podrażnienie i reakcje alergiczne.

Zgłaszanie działań niepożądanych Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceutce, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Warunki przechowywania.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować po upływie terminu ważności.

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC.

Termin ważności (miesiąc i rok).

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

WYTWÓRNIA EUCERYNY LABORATORIUM FARMACEUTYCZNE „COEL” S.J.

E.Z.M. KONSTANTY

ul. Wł. Żeleńskiego 45, 31-353 Kraków.

Pozwolenie nr 20278

Nr serii:

Kod EAN UCC: 5909990988358

Oznakowanie opakowania bezpośredniego
(butelka z polietylenu z kroplomierzem i z zakretką z pierścieniem gwarancyjnym
z polietylenu)

Płyn Burowa COEL

Aluminii subacetatis solutio, 8,5 g/100 g

Płyn na skórę,

100 g

Skład. Płyn Burowa przygotowany jest zgodnie z recepturą Farmakopei Polskiej;

Płyn zawiera substancje czynne: siarczanu glinu, wapnia węglanu, kwasu octowego lodowatego (311g/l), substancja pomocnicza – woda oczyszczona.

Działanie. Ściągające i zmniejszające obrzęk spowodowany stanem zapalnym.

Wskazania do stosowania.

Stosować na skórę bez przerwanej ciągłości w stłuczeniach i obrzękach zapalnych tkanek miękkich.

Przeciwwskazania.

Nie stosować w obrębie twarzy, błon śluzowych i na otwarte rany oraz w nadwrażliwości na którykolwiek ze składników leku.

Środki ostrożności.

Unikać kontaktu płynu z oczami i błonami śluzowymi. Nie stosować w opatrunku zamkniętym. Nie stosować na duże powierzchnie ciała.

Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji.

Brak danych.

Stosowanie w czasie ciąży i karmienia.

Brak danych. Przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem.

Sposób stosowania i droga podania.

Lek stosuje się zewnętrznie na skórę. Należy 1 lub 2 łyżki stołowe preparatu rozcieńczyć w szklance wody. Świeżo przygotowanym roztworem nasączyć okład, przyłożyć na obrzęknięte miejsca, pozostawić do wyschnięcia. Stosować 1-3 razy dziennie przez okres nie dłuższy niż 3 dni.

Działania niepożądane.

Wielokrotne użycie na skórę u osób wrażliwych może spowodować podrażnienie i reakcje alergiczne.

Zgłaszanie działań niepożądanych Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Warunki przechowywania.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować po upływie terminu ważności.

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC.

Termin ważności (miesiąc i rok).

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

WYTWÓRNIA EUCERYNY LABORATORIUM FARMACEUTYCZNE „COEL” S.J.

E.Z.M. KONSTANTY

ul. Wł. Żeleńskiego 45, 31-353 Kraków.

Pozwolenie nr 20278

Nr serii:

Kod EAN UCC: 5909990988365

Oznakowanie opakowania bezpośredniego
(butelka z polietylenu z zakrętką z pierścieniem gwarancyjnym z polietylenu)

Płyn Burowa COEL

Aluminii subacetatis solutio, 8,5 g/100 g

Płyn na skórę,

250 g

Skład. Płyn Burowa przygotowany jest zgodnie z recepturą Farmakopei Polskiej;

Płyn zawiera substancje czynne: siarczanu glinu, wapnia węglanu, kwasu octowego lodowatego (311 g/l), substancja pomocnicza – woda oczyszczona.

substancja pomocnicza – woda oczyszczona.

Działanie. Ściągające i zmniejszające obrzęk spowodowany stanem zapalnym.

Wskazania do stosowania.

Stosować na skórę bez przerwanej ciągłości w stłuczeniach i obrzękach zapalnych tkanek miękkich.

Przeciwwskazania.

Nie stosować w obrębie twarzy, błon śluzowych i na otwarte rany oraz w nadwrażliwości na którykolwiek ze składników leku.

Środki ostrożności.

Unikać kontaktu płynu z oczami i błonami śluzowymi. Nie stosować w opatrunku zamkniętym. Nie stosować na duże powierzchnie ciała.

Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji.

Brak danych.

Stosowanie w czasie ciąży i karmienia.

Brak danych. Przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem.

Sposób stosowania i droga podania.

Lek stosuje się zewnętrznie na skórę. Należy 1 lub 2 łyżki stołowe preparatu rozcieńczyć w szklance wody. Świeżo przygotowanym roztworem nasączyć okład, przyłożyć na obrzęknięte miejsca, pozostawić do wyschnięcia. Stosować 1-3 razy dziennie przez okres nie dłuższy niż 3 dni.

Działania niepożądane.

Wielokrotne użycie na skórę u osób wrażliwych może spowodować podrażnienie i reakcje alergiczne.

Zgłaszanie działań niepożądanych Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Warunki przechowywania.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować po upływie terminu ważności.

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC.

Termin ważności (miesiąc i rok).

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

WYTWÓRNIĄ EUCERYNY LABORATORIUM FARMACEUTYCZNE „COEL” S.J.

E.Z.M. KONSTANTY

ul. Wł. Żeleńskiego 45, 31-353 Kraków.

Pozwolenie nr 20278

Nr serii:

Kod EAN UCC: 5909990988372

Oznakowanie opakowania bezpośredniego
(butelka z polietylenu z zakrętką z pierścieniem gwarancyjnym z polietylenu)

Opakowanie przeznaczone do stosowania w lecznictwie zamkniętym.

Płyn Burowa COEL

Alumini subacetatis solutio, 8,5 g/100 g

Płyn na skórę,

500 g

Skład. Płyn Burowa przygotowany jest zgodnie z recepturą Farmakopei Polskiej; Płyn zawiera substancje czynne: siarczanu glinu, wapnia węglanu, kwasu octowego lodowatego (311g/l), substancja pomocnicza – woda oczyszczona.

Działanie. Ściągające i zmniejszające obrzęk spowodowany stanem zapalnym.

Wskazania do stosowania.

Stosować na skórę bez przerwanej ciągłości w stłuczeniach i obrzękach zapalnych tkanek miękkich.

Przeciwwskazania.

Nie stosować w obrębie twarzy, błon śluzowych i na otwarte rany oraz w nadwrażliwości na którykolwiek ze składników leku.

Środki ostrożności.

Unikać kontaktu płynu z oczami i błonami śluzowymi. Nie stosować w opatrunku zamkniętym. Nie stosować na duże powierzchnie ciała.

Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji.

Brak danych.

Stosowanie w czasie ciąży i karmienia.

Brak danych. Przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem.

Sposób stosowania i droga podania.

Lek stosuje się zewnętrznie na skórę. Należy 1 lub 2 łyżki stołowe preparatu rozcieńczyć w szklance wody. Świeżo przygotowanym roztworem nasączyć okład, przyłożyć na obrzęknięte miejsca, pozostawić do wyschnięcia. Stosować 1-3 razy dziennie przez okres nie dłuższy niż 3 dni.

Działania niepożądane.

Wielokrotne użycie na skórę u osób wrażliwych może spowodować podrażnienie i reakcje alergiczne.

Zgłaszanie działań niepożądanych Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceutce, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Warunki przechowywania.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować po upływie terminu ważności.

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC.

Termin ważności (miesiąc i rok).

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

WYTWÓRNIA EUCERYNY LABORATORIUM FARMACEUTYCZNE „COEL” S.J.

E.Z.M. KONSTANTY

ul. Wł. Żeleńskiego 45, 31-353 Kraków.

Pozwolenie nr 20278

Nr serii:

Kod EAN UCC: 5909990988389

Oznakowanie opakowania bezpośredniego
(butelka z polietylenu z zakrętką z pierścieniem gwarancyjnym z polietylenu)

Opakowanie przeznaczone do stosowania w lecznictwie zamkniętym.

Płyn Burowa COEL

Aluminii subacetatis solutio, 8,5 g/100 g

Płyn na skórę,

1 kg

Skład. Płyn Burowa przygotowany jest zgodnie z recepturą Farmakopei Polskiej;

Płyn zawiera substancje czynne: siarczanu glinu,, wapnia węgla, kwasu octowego lodowatego (311g/l), substancja pomocnicza – woda oczyszczona.

Działanie. Ściągające i zmniejszające obrzęk spowodowany stanem zapalnym.

Wskazania do stosowania.

Stosować na skórę bez przerwanej ciągłości w stłuczeniach i obrzękach zapalnych tkanek miękkich.

Przeciwwskazania.

Nie stosować w obrębie twarzy, błon śluzowych i na otwarte rany oraz w nadwrażliwości na którykolwiek ze składników leku.

Środki ostrożności.

Unikać kontaktu płynu z oczami i błonami śluzowymi. Nie stosować w opatrunku zamkniętym. Nie stosować na duże powierzchnie ciała.

Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji.

Brak danych.

Stosowanie w czasie ciąży i karmienia.

Brak danych. Przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem.

Sposób stosowania i droga podania.

Lek stosuje się zewnętrznie na skórę. Należy 1 lub 2 łyżki stołowe preparatu rozcieńczyć w szklance wody. Świeżo przygotowanym roztworem nasączyć okład, przyłożyć na obrzęknięte miejsca, pozostawić do wyschnięcia. Stosować 1-3 razy dziennie przez okres nie dłuższy niż 3 dni.

Działania niepożądane.

Wielokrotne użycie na skórę u osób wrażliwych może spowodować podrażnienie i reakcje alergiczne.

Zgłaszanie działań niepożądanych Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceutce, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Warunki przechowywania.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować po upływie terminu ważności.

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC.

Termin ważności (miesiąc i rok).

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

WYTWÓRNIA EUCERYNY LABORATORIUM FARMACEUTYCZNE „COEL” S.J.

E.Z.M. KONSTANTY

ul. Wł. Żeleńskiego 45, 31-353 Kraków.

Pozwolenie nr 20278

Nr serii:

Kod EAN UCC: 5909990988396

Oznakowanie opakowania bezpośredniego
(pojemnik z polietylenu z zakrętką z pierścieniem gwarancyjnym z polietylenu)
Opakowanie przeznaczone do stosowania w lecznictwie zamkniętym

Płyn Burowa COEL

Aluminii subacetatis solutio, 8,5 g/100 g

Płyn na skórę,

5 kg

Skład. Płyn Burowa przygotowany jest zgodnie z recepturą Farmakopei Polskiej; 100g płynu zawiera 8,5g zasadowego octanu glinu – substancji czynnej [otrzymywany z siarczanu glinu – 15,24g, wapnia węglanu– 7,12g, kwasu octowego lodowatego – 5,49g], substancja pomocnicza – woda oczyszczona.

Działanie. Ściągające i zmniejszające obrzęk spowodowany stanem zapalnym.

Wskazania do stosowania.

Stosować na skórę bez przerwanej ciągłości w stłuczeniach i obrzękach zapalnych tkanek miękkich.

Przeciwwskazania.

Nie stosować w obrębie twarzy, błon śluzowych i na otwarte rany oraz w nadwrażliwości na którykolwiek ze składników leku.

Środki ostrożności.

Unikać kontaktu płynu z oczami i błonami śluzowymi. Nie stosować w opatrunku zamkniętym. Nie stosować na duże powierzchnie ciała.

Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji.

Brak danych.

Stosowanie w czasie ciąży i karmienia.

Brak danych. Przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem.

Sposób stosowania i droga podania.

Lek stosuje się zewnętrznie na skórę. Należy 1 lub 2 łyżki stołowe preparatu rozcieńczyć w szklance wody. Świeżo przygotowanym roztworem nasączyć okład, przyłożyć na obrzęknięte miejsca, pozostawić do wyschnięcia. Stosować 1-3 razy dziennie przez okres nie dłuższy niż 3 dni.

Działania niepożądane.

Wielokrotne użycie na skórę u osób wrażliwych może spowodować podrażnienie i reakcje alergiczne.

Zgłaszanie działań niepożądanych Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Warunki przechowywania.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować po upływie terminu ważności.

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC.

Termin ważności (miesiąc i rok).

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

WYTWÓRNIA EUCERYNY LABORATORIUM FARMACEUTYCZNE „COEL” S.J.

E.Z.M. KONSTANTY

ul. Wł. Żeleńskiego 45, 31-353 Kraków.

Pozwolenie nr 20278

Nr serii:

Kod EAN UCC: 5909990988402

Oznakowanie opakowania bezpośredniego
(pojemnik z polietylenu z zakrętką z pierścieniem gwarancyjnym z polietylenu)

Opakowanie przeznaczone do stosowania w lecznictwie zamkniętym.

Płyn Burowa COEL

Aluminii subacetatis solutio, 8,5 g/100 g

Płyn na skórę,

10 kg

Skład. Płyn Burowa przygotowany jest zgodnie z recepturą Farmakopei Polskiej; Płyn zawiera substancje czynne: siarczanu glinu,, wapnia węglanu, kwasu octowego lodowatego (311g/l), substancja pomocnicza – woda oczyszczona.

Działanie. Ściągające i zmniejszające obrzęk spowodowany stanem zapalnym.

Wskazania do stosowania.

Stosować na skórę bez przerwanej ciągłości w stłuczeniach i obrzękach zapalnych tkanek miękkich.

Przeciwwskazania.

Nie stosować w obrębie twarzy, błon śluzowych i na otwarte rany oraz w nadwrażliwości na którykolwiek ze składników leku.

Środki ostrożności.

Unikać kontaktu płynu z oczami i błonami śluzowymi. Nie stosować w opatrunku zamkniętym. Nie stosować na duże powierzchnie ciała.

Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji.

Brak danych.

Stosowanie w czasie ciąży i karmienia.

Brak danych. Przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem.

Sposób stosowania i droga podania.

Lek stosuje się zewnętrznie na skórę. Należy 1 lub 2 łyżki stołowe preparatu rozcieńczyć w szklance wody. Świeżo przygotowanym roztworem nasączyć okład, przyłożyć na obrzęknięte miejsca, pozostawić do wyschnięcia. Stosować 1-3 razy dziennie przez okres nie dłuższy niż 3 dni.

Działania niepożądane.

Wielokrotne użycie na skórę u osób wrażliwych może spowodować podrażnienie i reakcje alergiczne.

Zgłaszanie działań niepożądanych Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceutce, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Warunki przechowywania.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować po upływie terminu ważności.

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC.

Termin ważności (miesiąc i rok).

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

WYTWÓRNIA EUCERYNY LABORATORIUM FARMACEUTYCZNE „COEL” S.J.

E.Z.M. KONSTANTY

ul. Wł. Żeleńskiego 45, 31-353 Kraków.

Pozwolenie nr 20278

Nr serii:

Kod EAN UCC: 5909990988440