

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

PUDEŁKO TEKTUROWE

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Rapydan, 70 mg + 70 mg, plaster leczniczy
Lidocainum + Tetracainum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)

Jeden plaster leczniczy zawiera:
Lidokaina 70 mg + Tetrakaina 70 mg

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Substancje pomocnicze: polietylenu, akrylan, proszek żelaza, węgiel aktywowany, chlorek sodu, mączka drzewna, filtr papierowy, aluminium, poliester uretan, alkohol poliwinylowy, sorbitolu monopalmitynian, woda oczyszczona, metylu parahydroksybenzoesan (E 218), propylu parahydroksybenzoesan (E 216), boran sodowy, powlekania włókien.

Dodatkowe szczegóły i informacje patrz: „Ulotka dołączona do opakowania”

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

1 plaster leczniczy KOD: 5909990654628

5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. Do stosowania na skórę.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Plaster leczniczy zawiera składnik uwalniający ciepło, który może osiągać maksymalną temperaturę 40°C.

Użyć niezwłocznie po otwarciu.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Gewijzigde veldcode

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Gewijzigde veldcode

EXP:

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

Zużyte plastry należy złożyć warstwą przylepną do środka i usunąć w bezpieczny sposób, aby uniemożliwić dzieciom bezpośredni kontakt z plastrem.

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Eurocept International BV, Trapgans 5, 1244 RL Ankeveen, Ten Holandia

12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 14748

13. NUMER SERII

Lot:

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

Produkt leczniczy wydawany z przepisu lekarza – Rp

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Rapydan

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

<Obejmuje kod 2D będący nośnikiem niepowtarzalnego identyfikatora.>

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

< PC: {numer} [kod produktu]

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Gewijzigde veldcode

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Gewijzigde veldcode

SN: {numer} [numer seryjny]
NN: {numer} [krajowy numer refundacyjny lub inny krajowy numer identyfikujący produkt leczniczy]>

Met opmaak: Nederlands (standaard)
Gewijzigde veldcode
Met opmaak: Nederlands (standaard)
Gewijzigde veldcode

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

PUDEŁKO TEKTUROWE

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Rapydan, 70 mg + 70 mg, plaster leczniczy
Lidocainum + Tetracainum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)

Jeden plaster leczniczy zawiera:
Lidokaina 70 mg + Tetrakaina 70 mg

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Substancje pomocnicze: polietylenu, akrylan, proszek żelaza, węgiel aktywowany, chlorek sodu, mączka drzewna, filtr papierowy, aluminium, poliester uretan, alkohol poliwinylowy, sorbitolu monopalmitynian, woda oczyszczona, metylu parahydroksybenzoesan (E 218), propylu parahydroksybenzoesan (E 216), boran sodowy, powlekania włókien.

Dodatkowe szczegóły i informacje patrz: „Ulotka dołączona do opakowania”

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

2 plastry lecznicze KOD: 5909990654635

5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. Do stosowania na skórę.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Plaster leczniczy zawiera składnik uwalniający ciepło, który może osiągać maksymalną temperaturę 40°C.

Użyć niezwłocznie po otwarciu.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Gewijzigde veldcode

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Gewijzigde veldcode

EXP:

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

Zużyte plastry należy złożyć warstwą przylepną do środka i usunąć w bezpieczny sposób, aby uniemożliwić dzieciom bezpośredni kontakt z plastrem.

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Eurocept International BV, Trapgans 5, 1244 RL Ankeveen, Ten Holandia

12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 14748

13. NUMER SERII

Lot:

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

Produkt leczniczy wydawany z przepisu lekarza – Rp

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Rapydan

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Gewijzigde veldcode

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Gewijzigde veldcode

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

PUDEŁKO TEKTUROWE

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Rapydan, 70 mg + 70 mg, plaster leczniczy
Lidocainum + Tetracainum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)

Jeden plaster leczniczy zawiera:
Lidokaina 70 mg + Tetrakaina 70 mg

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Substancje pomocnicze: polietylenu, akrylan, proszek żelaza, węgiel aktywowany, chlorek sodu, mączka drzewna, filtr papierowy, aluminium, poliester uretan, alkohol poliwinylowy, sorbitolu monopalmitynian, woda oczyszczona, metylu parahydroksybenzoesan (E 218), propylu parahydroksybenzoesan (E 216), boran sodowy, powlekania włókien.

Dodatkowe szczegóły i informacje patrz: „Ulotka dołączona do opakowania”

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

5 plastrów leczniczych KOD: 5909990654642

5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. Do stosowania na skórę.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Plaster leczniczy zawiera składnik uwalniający ciepło, który może osiągać maksymalną temperaturę 40°C.

Użyć niezwłocznie po otwarciu.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Gewijzigde veldcode

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Gewijzigde veldcode

EXP:

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

Zużyte plastry należy złożyć warstwą przylepną do środka i usunąć w bezpieczny sposób, aby uniemożliwić dzieciom bezpośredni kontakt z plastrem.

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Eurocept International BV, Trapgans 5, 1244 RL Ankeveen, Ten Holandia

12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 14748

13. NUMER SERII

Lot:

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

Produkt leczniczy wydawany z przepisu lekarza – Rp

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Rapydan

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Gewijzigde veldcode

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Gewijzigde veldcode

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

PUDEŁKO TEKTUROWE

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Rapydan, 70 mg + 70 mg, plaster leczniczy
Lidocainum + Tetracainum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)

Jeden plaster leczniczy zawiera:
Lidokaina 70 mg + Tetrakaina 70 mg

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Substancje pomocnicze: polietylenu, akrylan, proszek żelaza, węgiel aktywowany, chlorek sodu, mączka drzewna, filtr papierowy, aluminium, poliester uretan, alkohol poliwinylowy, sorbitolu monopalmitynian, woda oczyszczona, metylu parahydroksybenzoesan (E 218), propylu parahydroksybenzoesan (E 216), boran sodowy, powlekania włókien.

Dodatkowe szczegóły i informacje patrz: „Ulotka dołączona do opakowania”

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

10 plastrów leczniczych

5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. Do stosowania na skórę.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Plaster leczniczy zawiera składnik uwalniający ciepło, który może osiągać maksymalną temperaturę 40°C.

Użyć niezwłocznie po otwarciu.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Gewijzigde veldcode

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Gewijzigde veldcode

EXP:

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

Zużyte plastry należy złożyć warstwą przylepną do środka i usunąć w bezpieczny sposób, aby uniemożliwić dzieciom bezpośredni kontakt z plastrem.

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Eurocept International BV, Trapgans 5, 1244 RL Ankeveen, Ten Holandia

12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 14748

13. NUMER SERII

Lot:

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

Produkt leczniczy wydawany z przepisu lekarza – Rp

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Rapydan

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Gewijzigde veldcode

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Gewijzigde veldcode

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

PUDEŁKO TEKSTUOWE

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Rapydan, 70 mg + 70 mg, plaster leczniczy
Lidocainum + Tetracainum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)

Jeden plaster leczniczy zawiera:
Lidokaina 70 mg + Tetrakaina 70 mg

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Substancje pomocnicze: polietylenu, akrylan, proszek żelaza, węgiel aktywowany, chlorek sodu, mączka drzewna, filtr papierowy, aluminium, poliestr uretan, alkohol poliwinylowy, sorbitolu monopalmitynian, woda oczyszczona, metylu parahydroksybenzoesan (E 218), propylu parahydroksybenzoesan (E 216), boran sodowy, powlekania włókien.

Dodatkowe szczegóły i informacje patrz: „Ulotka dołączona do opakowania”

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

25 plastrów leczniczych KOD: 5909990654659

5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. Do stosowania na skórę.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Plaster leczniczy zawiera składnik uwalniający ciepło, który może osiągać maksymalną temperaturę 40°C.

Użyć niezwłocznie po otwarciu.

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Gewijzigde veldcode

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Gewijzigde veldcode

8. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP:

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

Zużyte plastry należy złożyć warstwą przylepną do środka i usunąć w bezpieczny sposób, aby uniemożliwić dzieciom bezpośredni kontakt z plastrem.

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Eurocept International BV, Trapgans 5, 1244 RL Ankeveen, Ten Holandia

12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 14748

13. NUMER SERII

Lot:

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

Produkt leczniczy wydawany z przepisu lekarza – Rp

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Rapydan

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Gewijzigde veldcode

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Gewijzigde veldcode

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

PUDELKO TEKSTUROWE

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Rapydan, 70 mg + 70 mg, plaster leczniczy
Lidocainum + Tetracainum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)

Jeden plaster leczniczy zawiera:
Lidokaina 70 mg + Tetrakaina 70 mg

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Substancje pomocnicze: polietylenu, akrylan, proszek żelaza, węgiel aktywowany, chlorek sodu, mączka drzewna, filtr papierowy, aluminium, poliester uretan, alkohol poliwinylowy, sorbitolu monopalmitynian, woda oczyszczona, metylu parahydroksybenzoesan (E 218), propylu parahydroksybenzoesan (E 216), boran sodowy, powlekania włókien.

Dodatkowe szczegóły i informacje patrz: „Ulotka dołączona do opakowania”

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

50 plastrów leczniczych

5. SPOSÓB I DROGA(D) PODANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. Do stosowania na skórę.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Plaster leczniczy zawiera składnik uwalniający ciepło, który może osiągać maksymalną temperaturę 40°C.

Użyć niezwłocznie po otwarciu.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Gewijzigde veldcode

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Gewijzigde veldcode

EXP:

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

Zużyte plastry należy złożyć warstwą przylepną do środka i usunąć w bezpieczny sposób, aby uniemożliwić dzieciom bezpośredni kontakt z plastrem.

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Eurocept International BV, Trapgans 5. 1244 RL Ankeveen, Ten Holandia

12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 14748

13. NUMER SERII

Lot:

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

Produkt leczniczy wydawany z przepisu lekarza – Rp

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Rapydan

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Gewijzigde veldcode

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Gewijzigde veldcode