

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH
TEKTUROWE PUDEŁKO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Septofar Mięta, 0,6 mg + 1,2 mg, pastylki twarde

Amylmetacresolum + Alcohol 2,4-dichlorobenzylicus

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każda pastylka twarda zawiera 0,6 mg amylometakrezolu oraz 1,2 mg alkoholu 2,4-dichlorobenzylowego.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Substancje pomocnicze: olejek eteryczny miętowy, olejek eteryczny anyżu gwiaździstego, lewomentol, barwnik indygokarminowy (E 132), żółcień chinolinowa (E 104), sacharyna sodowa (E 954), kwas winowy (E 334), izomalt (E 953), maltitol (E 965).

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

pastylka twarda

6 pastylek twardych	– kod: 5909991289669
8 pastylek twardych	– kod: 5909991289676
10 pastylek twardych	– kod: 5909991289683
12 pastylek twardych	– kod: 5909991289690
16 pastylek twardych	– kod: 5909991289706
20 pastylek twardych	– kod: 5909991289713
24 pastylki twarde	– kod: 8595566457006
30 pastylek twardych	– kod: 5909991289737
36 pastylek twardych	– kod: 5909991289744
40 pastylek twardych	– kod: 5909991289751
48 pastylek twardych	– kod: 5909991289768

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Do stosowania na błonę śluzową jamy ustnej.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP

EXP = Termin ważności

9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA
--

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE
--

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO
--

Podmiot odpowiedzialny:

Dr. Max Pharma s.r.o.

Na Florenci 2116/15

Nové Město

110 00 Praga

Republika Czeska

[logo podmiotu odpowiedzialnego]

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie numer: 23495

13. NUMER SERII

Lot

Lot = Numer serii

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Do łagodzenia objawów bólu gardła.

Dawkowanie:

Dorośli: 1 pastylka co 2-3 godziny. Maksymalnie 8 pastylek w ciągu 24 godzin.

Młodzież i dzieci w wieku powyżej 6 lat: 1 pastylka co 2-3 godziny. Maksymalnie 4 pastylki w ciągu 24 godzin.

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

septofar mięta

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D
--

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH

BLISTER

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Septofar Mięta, 0,6 mg + 1,2 mg, pastylki twarde

Amylmetacresolum + Alcohol 2,4-dichlorobenzylicus

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Dr. Max Pharma s.r.o.

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP

4. NUMER SERII

Lot

5. INNE

[logo podmiotu odpowiedzialnego]