

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH
TEKTUROWE PUDEŁKO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Septofar Miód i Cytryna, 0,6 mg + 1,2 mg, pastylki, twarde

Amylmetacresolum + Alcohol 2,4-dichlorobenzylicus

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każda pastylka twarda zawiera 0,6 mg amylometakrezolu oraz 1,2 mg alkoholu 2,4-dichlorobenzylowego.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Substancje pomocnicze:

olejek eteryczny miętowy, żółcień chinolinowa (E 104), sacharyna sodowa (E 954), kwas winowy (E 334), żółcień pomarańczowa (E 110), aromat cytrynowy, aromat miodowy, izomalt (E 953), maltitol (E 965).

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

pastylka twarda

6 pastylek twardych	– kod: 5909991289775
8 pastylek twardych	– kod: 5909991289782
10 pastylek twardych	– kod: 5909991289799
12 pastylek twardych	– kod: 5909991289805
16 pastylek twardych	– kod: 5909991289812
20 pastylek twardych	– kod: 5909991289829
24 pastylki twarde	– kod: 8595566456986
30 pastylek twardych	– kod: 5909991289843
36 pastylek twardych	– kod: 5909991289850
40 pastylek twardych	– kod: 5909991289867
48 pastylek twardych	– kod: 5909991289874

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Do stosowania na błonę śluzową jamy ustnej.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP

EXP = Termin ważności

9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny:

Dr. Max Pharma s.r.o.

Na Florenci 2116/15

Nové Město

110 00 Praga

Republika Czeska

[logo podmiotu odpowiedzialnego]

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie numer: 23496

13. NUMER SERII

Lot

Lot = Numer serii

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Do łagodzenia objawów bólu gardła.

Dawkowanie:

Dorośli: 1 pastylka, co 2-3 godziny. Maksymalnie 8 pastylek w ciągu 24 godzin.

Młodzież i dzieci w wieku powyżej 6 lat: 1 pastylka co 2-3 godziny. Maksymalnie 4 pastylki w ciągu 24 godzin.

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

septofar miód i cytryna

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH

BLISTER

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Septofar Miód i Cytryna, 0,6 mg + 1,2 mg, pastylki, twarde

Amylmetacresolum + Alcohol 2,4-dichlorobenzylicus

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Dr. Max Pharma s.r.o.

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP

4. NUMER SERII

Lot

5. INNE

[logo podmiotu odpowiedzialnego]