

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

SPIRYTUS SALICYLOWY 2 %



Spiritus Salicylatus

roztwór na skórę

50 ml (butelka PE z dozownikiem i zakrętką PE z pierścieniem gwarancyjnym) **kod EAN: 5909990026760**

100 ml (butelka PE z dozownikiem i zakrętką PE z pierścieniem gwarancyjnym) **kod EAN: 5909990026791**

Skład:

- substancja czynna: 100 g płynu zawiera 2 g kwasu salicylowego;
- substancje pomocnicze: etanol 760 g/l, woda oczyszczona.

Wskazania: odkażanie skóry, otarcia naskórka, trądzik, łojotok.

Przeciwwskazania: nadwrażliwość na salicylany. Nie stosować u noworodków i niemowląt.

Specjalne ostrzeżenia: jeśli objawy nasila się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. Lek zawiera ok. 70% obj. etanolu. Chronić oczy przed kontaktem z lekiem. Nie stosować przez czas dłuższy.

Interakcje: nie stwierdzono.

Ciąża i karmienie piersią: przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn: zastosowanie na większe powierzchnie ciała lub przypadkowe wypicie powoduje obniżenie zdolności obsługi maszyn i prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Droga podania i sposób stosowania: przecierać skórę tamponem lub wacikiem nasączonym płynem. Do użytku zewnętrznego.

Działania niepożądane: nie stwierdzono. Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione na tym opakowaniu należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: +48 22 49 21 301, Fax: +48 22 49 21 309, Strona internetowa: <https://smz.ezdrowie.gov.pl>. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Przedawkowanie: lek do stosowania miejscowego. W przypadku nasilenia się objawów należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Pominięcie dawki: nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Warunki przechowywania: przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Środek łatwopalny. Przezroczysta ciecz o charakterystycznym zapachu etanolu. Nie stosować po upływie terminu ważności. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa.

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC.

Termin ważności:

Podmiot odpowiedzialny: Gemipharma Sp.z o.o. ul. Mickiewicza 36, 05-480 Karczew

Pozwolenie nr IL-2906/ChF

Nr serii:

Informacja podana w systemie Braille'a: spirytus salicylowy 2% gemi

Data zatwierdzenia: 10/2024

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH
(butelka PE z zakrętką PE z pierścieniem gwarancyjnym)

SPIRYTUS SALICYLOWY 2 %



Spiritus Salicylatus
roztwór na skórę

900 ml

Skład:

- substancja czynna: 100 g płynu zawiera 2 g kwasu salicylowego;
- substancje pomocnicze: etanol 760 g/l, woda oczyszczona.

Wskazania do stosowania: odkażanie skóry, otarcia naskórka, trądzik, łojotok.

Przeciwwskazania: nadwrażliwość na salicylany. Nie stosować u noworodków i niemowląt.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. Lek zawiera ok. 70% obj. etanolu. Chronić oczy przed kontaktem z lekiem. Nie stosować przez czas dłuższy.

Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji: nie stwierdzono.

Ciąża i karmienie piersią: przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn: zastosowanie na większe powierzchnie ciała lub przypadkowe wypicie powoduje obniżenie zdolności obsługi maszyn i prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Droga podania i sposób stosowania: przecierać skórę tamponem lub wacikiem nasączonym płynem. Do użytku zewnętrznego. Opakowanie jest przeznaczone do stosowania w leczeniu zamkniętym i recepturze aptecznej.

Działania niepożądane: nie stwierdzono. Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione na tym opakowaniu należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: +48 22 49 21 301, Fax: +48 22 49 21 309, Strona internetowa: <https://smz.ezdrowie.gov.pl>. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Przedawkowanie: lek do stosowania miejscowego. W przypadku nasilenia się objawów należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Pominięcie dawki: nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Warunki przechowywania: przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Środek łatwopalny. Przezroczysta ciecz o charakterystycznym zapachu etanolu.

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC.

Termin ważności:

Podmiot odpowiedzialny: Gemipharma Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 36 05-480 Karczew

Pozwolenie nr IL-2906/ChF

Nr serii:

kod EAN: 5909990026876

Data zatwierdzenia: