

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

Tekturowe pudełko

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Strepsils pomarańczowy z witaminą C
1,2 mg + 0,6 mg, pastylki twarde
Alcohol 2,4-dichlorobenzylicus + Amylmetacresolum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Jedna pastylka twarda zawiera substancje czynne: 1,2 mg alkoholu 2,4-dichlorobenzylowego i 0,6 mg amylometakrezolu

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

oraz substancje pomocnicze: witaminę C (kwas askorbowy i sodu askorbinian), esencję pomarańczową (zawierającą również cytral, cytronellol, d-limonen, geraniol, linalol i etanol), kwas winowy, lewomentol, glikol propylenowy, żółcień pomarańczową (E110), czerwień koszenilową (E124), glukozę ciekłą [zawierającą skrobię pszeniczną i dwutlenek siarki (E220)] i sacharozę ciekłą.

Dalsze informacje - patrz ulotka.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Pastylka twarda

8 pastylek twardych	Kod: 5909990192311
12 pastylek twardych	Kod: 5909990192335
24 pastylki twarde	Kod: 5909990192328
36 pastylek twardych	Kod: 5909990645077

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie na błonę śluzową jamy ustnej.
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP):

Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S.A., ul. Okunin 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

{logo podmiotu odpowiedzialnego}

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: R/1923

13. NUMER SERII

Nr serii (Lot):

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Do stosowania w stanach zapalnych jamy ustnej i gardła.

Każda pastylka Strepsils pomarańczowy z witaminą C zawiera dwie substancje czynne o działaniu:

- przeciwwirusowym
- przeciwbakteryjnym

Lek Strepsils pomarańczowy z witaminą C jest przeznaczony do stosowania w objawowym leczeniu stanów zapalnych jamy ustnej i gardła.

Jak stosować lek Strepsils pomarańczowy z witaminą C:

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat: ssać powoli jedną pastylkę co 2 - 3 godziny.

Nie należy stosować dawki większej niż 8 pastylek na dobę. Jeśli po upływie 3 dni dolegliwości nie ustępują lub nasilają się, należy zasięgnąć porady lekarza.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Strepsils pomarańczowy z witaminą C

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.