

OZNAKOWANIE OPAKOWANIA BEZPOŚREDNIEGO UMIESZCZONEGO W
OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM CERAMICZNYM (worek 1 kg)

BOCHEŃSKA LECZNICZA SÓL JODOWO – BROMOWA
sól jodowo – bromowa

Produkt leczniczy zawiera sól jodowo – bromową, w tym:

jodki - nie mniej niż 0,03%; bromki- nie mniej niż 0,05% ; wapń- nie więcej niż 1,5% ;
magnez- nie więcej niż 0,8% ; sód -nie mniej niż 32% ; potas- nie więcej niż 0,5%;
chlorki- nie mniej niż 55% ; żelazo -nie więcej niż 0,001% ; woda- nie więcej niż 18% ; składniki
nierozpuszczalne w wodzie -nie więcej niż 0,5%

Postać farmaceutyczna:

proszek krystaliczny

Zawartość opakowania:

1 kg

Sposób działania:

Ciepła kąpiel mineralna działa kompleksowo poprzez czynniki termiczne, mechaniczne (ciśnienie hydrostatyczne) i chemiczne.

Odpowiednie stężenie roztworu i optymalna temperatura (35-36°C) działają zarówno na skórę i błony śluzowe, jak i pośrednio na cały organizm.

Odpowiednia temperatura i składniki mineralne kąpeli powodują rozpułchnienie naskórka, umożliwiając wchłanianie składników mineralnych. Powstający na skórze „płaszcz solny” dostarcza długotrwałych bodźców osmotycznych, działa antyseptycznie i wspomaga leczenie chorób skóry. Kąpiele solankowe wywierają działanie przegrzewające silniejsze niż kąpiele wodne, pobudzając procesy biochemiczne w trakcie i przez dłuższy czas po kąpeli. W wyniku serii kąpeli obserwuje się normalizację czynności wegetatywnego układu nerwowego i układu przysadka-nadnercza, co zmniejsza nasilenie objawów schorzeń reumatycznych. Zmniejsza się przewodnictwo skóry, dolegliwości neuralgiczne ulegają osłabieniu, zmniejsza się nerwowość i pobudzenie.

Kąpiele i inhalacje ułatwiają likwidację ognisk zapalnych, działają przeciwzapalnie i odkażająco. Podczas inhalacji rozrzedzeniu ulega śluz zalegający w drogach oddechowych. Roztwór soli jodowo-bromowej działa przeciwzapalnie i antyseptycznie. Związki jodu mogą wpływać na gruczoł tarczowy.

Wskazania do stosowania:

Kąpiele:

- w schorzeniach reumatycznych: reumatoidalne zapalenie stawów, zeszywniające zapalenie stawów kręgosłupa, choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa i stawów, zapalenie reumatyczne mięśni i ścięgien, zapalenie korzonków nerwowych, schorzenia pourazowe narządu ruchu, rekonwalescencja;
- w chorobach przemiany materii: dnawe zapalenie stawów, profilaktyka niedoczynności tarczycy;
- w ginekologii: przewlekłe zapalenie przydatków;

- w dermatologii, jako środek pomocniczy:
łuszczyca, rybia łuska, wyprysk przewlekły, nerwice naczyniowe;
- w chorobach układu naczyniowego:
zaburzenia ukrwienia obwodowego kończyn.

Kąpiele można stosować w stanach zmęczenia, w celu poprawy ogólnej kondycji fizycznej.

Inhalacje (i kąpiele)

- przewlekłe choroby dróg oddechowych i zatok obocznych nosa.

Środki ostrożności i przeciwwskazania związane ze stosowaniem:

Ciepłych kąpieeli całego ciała w roztworach soli mineralnych, podobnie jak ciepłej kąpieli wodnej, nie należy stosować w przypadkach, gdy ze względu na ogólny stan organizmu niewskazane jest narażenie na działanie silnych bodźców.

Przeciwwskazane jest stosowanie leku w ostrych stanach zapalnych, niewydolność krążenia, chorobach naczyń wieńcowych, wadach serca, zaburzeniach rytmu serca, chorobach nowotworowych, czynnych procesach gruźliczych, nadciśnieniu tętniczym, psychopatii, nadczynności tarczycy.

Nie zaleca się inhalacji roztworami soli we wszystkich ostrych stanach chorobowych dróg oddechowych.

Interakcje: Nie stwierdzono.

Ciąża i karmienie piersią: Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza. Nie stosować w okresie ciąży.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn: Nie stwierdzono wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie maszyn.

Dawkowanie i sposób stosowania;

Do użytku zewnętrznego w postaci roztworu wodnego do kąpieli i inhalacji.

Kąpiele (temperatura 35-36°C)

Zaleca się stosowanie roztworu o stężeniu od 1% do 3% (1-3 kg soli na 100 l wody), wyjątkowo w chorobach skóry 6% (6 kg soli na 100 l wody). Leczenie należy rozpocząć od niższego stężenia, a następnie stopniowo zwiększać stężenie. Dla dzieci stężenie roztworu do kąpieli nie powinno być większe niż 1,5% (1,5 kg na 100 l wody), wanna zawiera około 100 l wody.

Inhalacje (temperatura 37°C)

Zaleca się stosowanie roztworu o stężeniu do 3% (30 g na 1 l wody).

Inhalacje wykonuje się przez bezpośrednie wdychanie oparów roztworu lub przy użyciu inhalatora (łyżka stołowa zawiera około 10 g soli).

Zgłaszanie działań niepożądanych:

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Pozwolenie nr R/3319

OTC- Lek wydawany bez recepty

Nr serii:

((Logo firmy))

Termin ważności:

5	9	0	9	9	9	0	0	7	3	2	5	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Podmiot odpowiedzialny:

Zakład Przeróbki Solanek Jodowo-Bromowych

„SALCO” Spółka Jawna

32-744 Łapczyca 445 tel. 16 6127519

e-mail: biuro@salco.pl www.salco.pl

Informacja podana brajłem:

BOCHEŃSKA LECZNICZA SÓL JODOWO – BROMOWA

Data zatwierdzenia tekstu:

OZNAKOWANIE OPAKOWANIA BEZPOŚREDNIEGO (worek 1 kg)

BOCHEŃSKA LECZNICZA SÓL JODOWO – BROMOWA sól jodowo – bromowa

Produkt leczniczy zawiera sól jodowo – bromową, w tym:

jodki - nie mniej niż 0,03%; bromki- nie mniej niż 0,05% ; wapń- nie więcej niż 1,5% ; magnez- nie więcej niż 0,8% ; sód -nie mniej niż 32% ; potas- nie więcej niż 0,5%; chlorki- nie mniej niż 55% ; żelazo -nie więcej niż 0,001% ; woda- nie więcej niż 18% ; składniki nierozpuszczalne w wodzie -nie więcej niż 0,5%

Postać farmaceutyczna:

proszek krystaliczny

Zawartość opakowania:

1 kg

Sposób działania:

Ciepła kąpiel mineralna działa kompleksowo poprzez czynniki termiczne, mechaniczne (ciśnienie hydrostatyczne) i chemiczne.

Odpowiednie stężenie roztworu i optymalna temperatura (35-36°C) działają zarówno na skórę i błony śluzowe, jak i pośrednio na cały organizm.

Odpowiednia temperatura i składniki mineralne kąpeli powodują rozpułchnienie naskórka, umożliwiając wchłanianie składników mineralnych. Powstający na skórze „płaszcz solny” dostarcza długotrwałych bodźców osmotycznych, działa antyseptycznie i wspomaga leczenie chorób skóry. Kąpiele solankowe wywierają działanie przegrzewające silniejsze niż kąpiele wodne, pobudzając procesy biochemiczne w trakcie i przez dłuższy czas po kąpeli. W wyniku serii kąpeli obserwuje się normalizację czynności wegetatywnego układu nerwowego i układu przysadka-nadnercza, co zmniejsza nasilenie objawów schorzeń reumatycznych. Zmniejsza się przewodnictwo skóry, dolegliwości neuralgiczne ulegają osłabieniu, zmniejsza się nerwowość i pobudzenie.

Kąpiele i inhalacje ułatwiają likwidację ognisk zapalnych, działają przeciwzapalnie i odkażająco. Podczas inhalacji rozrzedzeniu ulega śluz zalegający w drogach oddechowych. Roztwór soli jodowo-bromowej działa przeciwzapalnie i antyseptycznie. Związki jodu mogą wpływać na gruczoł tarczowy.

Wskazania do stosowania:

Kąpiele:

- w schorzeniach reumatycznych: reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa i stawów, zapalenie reumatyczne mięśni i ścięgien, zapalenie korzonków nerwowych, schorzenia pourazowe narządu ruchu, rekonwalescencja;
- w chorobach przemiany materii: dnawe zapalenie stawów, profilaktyka niedoczynności tarczycy;
- w ginekologii: przewlekłe zapalenie przydatków;
- w dermatologii, jako środek pomocniczy;

- łuszczyca, rybia łuska, wyprysk przewlekły, nerwice naczyniowe;
– w chorobach układu naczyniowego:
zaburzenia ukrwienia obwodowego kończyn.

Kąpiele można stosować w stanach zmęczenia, w celu poprawy ogólnej kondycji fizycznej.

Inhalacje (i kąpiele)

- przewlekłe choroby dróg oddechowych i zatok obocznych nosa.

Środki ostrożności i przeciwwskazania związane ze stosowaniem:

Ciepłych kąpieeli całego ciała w roztworach soli mineralnych, podobnie jak ciepłej kąpieeli wodnej, nie należy stosować w przypadkach, gdy ze względu na ogólny stan organizmu niewskazane jest narażenie na działanie silnych bodźców.

Przeciwwskazane jest stosowanie leku w ostrych stanach zapalnych, niewydolność krążenia, chorobach naczyń wieńcowych, wadach serca, zaburzeniach rytmu serca, chorobach nowotworowych, czynnych procesach gruźliczych, nadciśnieniu tętniczym, psychopatii, nadczynności tarczycy.

Nie zaleca się inhalacji roztworami soli we wszystkich ostrych stanach chorobowych dróg oddechowych.

Interakcje: Nie stwierdzono.

Ciąża i karmienie piersią: Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.
Nie stosować w okresie ciąży.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn: Nie stwierdzono wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie maszyn.

Dawkowanie i sposób stosowania;

Do użytku zewnętrznego w postaci roztworu wodnego do kąpieeli i inhalacji.

Kąpiele (temperatura 35-36°C)

Zaleca się stosowanie roztworu o stężeniu od 1% do 3% (1-3 kg soli na 100 l wody), wyjątkowo w chorobach skóry 6% (6 kg soli na 100 l wody). Leczenie należy rozpocząć od niższego stężenia, a następnie stopniowo zwiększać stężenie. Dla dzieci stężenie roztworu do kąpieeli nie powinno być większe niż 1,5% (1,5 kg na 100 l wody), wanna zawiera około 100 l wody.

Inhalacje (temperatura 37°C)

Zaleca się stosowanie roztworu o stężeniu do 3% (30 g na 1 l wody).

Inhalacje wykonuje się przez bezpośrednie wdychanie oparów roztworu lub przy użyciu inhalatora (łyżka stołowa zawiera około 10 g soli).

Zgłaszanie działań niepożądanych:

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Pozwolenie nr R/3319

OTC- Lek wydawany bez recepty

Nr serii:

((Logo firmy))

Termin ważności:

5	9	0	9	9	9	0	3	3	1	9	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Podmiot odpowiedzialny:

Zakład Przeróbki Solanek Jodowo-Bromowych

„SALCO” Spółka Jawna

32-744 Łapczyca 445 tel. 16 6127519

e-mail: biuro@salco.pl www.salco.pl

Informacja podana brajlem:

BOCHEŃSKA LECZNICZA SÓL JODOWO – BROMOWA

Data zatwierdzenia tekstu:

OZNAKOWANIE OPAKOWANIA BEZPOŚREDNIEGO (worek 10 kg)

BOCHEŃSKA LECZNICZA SÓL JODOWO – BROMOWA sól jodowo – bromowa

Produkt leczniczy zawiera sól jodowo – bromową, w tym:

jodki - nie mniej niż 0,03%; bromki- nie mniej niż 0,05% ; wapń- nie więcej niż 1,5% ; magnez- nie więcej niż 0,8% ; sód -nie mniej niż 32% ; potas- nie więcej niż 0,5%; chlorki- nie mniej niż 55% ; żelazo -nie więcej niż 0,001% ; woda- nie więcej niż 18% ; składniki nierozpuszczalne w wodzie -nie więcej niż 0,5%

Postać farmaceutyczna:

proszek krystaliczny

Zawartość opakowania:

1 kg

Sposób działania:

Ciepła kąpiel mineralna działa kompleksowo poprzez czynniki termiczne, mechaniczne (ciśnienie hydrostatyczne) i chemiczne.

Odpowiednie stężenie roztworu i optymalna temperatura (35-36°C) działają zarówno na skórę i błony śluzowe, jak i pośrednio na cały organizm.

Odpowiednia temperatura i składniki mineralne kąpeli powodują rozpułchnienie naskórka, umożliwiając wchłanianie składników mineralnych. Powstający na skórze „płaszcz solny” dostarcza długotrwałych bodźców osmotycznych, działa antyseptycznie i wspomaga leczenie chorób skóry. Kąpiele solankowe wywierają działanie przegrzewające silniejsze niż kąpiele wodne, pobudzając procesy biochemiczne w trakcie i przez dłuższy czas po kąpeli. W wyniku serii kąpeli obserwuje się normalizację czynności wegetatywnego układu nerwowego i układu przysadka-nadnercza, co zmniejsza nasilenie objawów schorzeń reumatycznych. Zmniejsza się przewodnictwo skóry, dolegliwości neuralgiczne ulegają osłabieniu, zmniejsza się nerwowość i pobudzenie.

Kąpiele i inhalacje ułatwiają likwidację ognisk zapalnych, działają przeciwzapalnie i odkażająco. Podczas inhalacji rozrzedzeniu ulega śluz zalegający w drogach oddechowych. Roztwór soli jodowo-bromowej działa przeciwzapalnie i antyseptycznie. Związki jodu mogą wpływać na gruczoł tarczowy.

Wskazania do stosowania:

Kąpiele:

- w schorzeniach reumatycznych: reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa i stawów, zapalenie reumatyczne mięśni i ścięgien, zapalenie korzonków nerwowych, schorzenia pourazowe narządu ruchu, rekonwalescencja;
- w chorobach przemiany materii: dnawe zapalenie stawów, profilaktyka niedoczynności tarczycy;
- w ginekologii: przewlekłe zapalenie przydatków;
- w dermatologii, jako środek pomocniczy;

- łuszczyca, rybia łuska, wyprysk przewlekły, nerwice naczyniowe;
– w chorobach układu naczyniowego:
zaburzenia ukrwienia obwodowego kończyn.

Kąpiele można stosować w stanach zmęczenia, w celu poprawy ogólnej kondycji fizycznej.

Inhalacje (i kąpiele)

- przewlekłe choroby dróg oddechowych i zatok obocznych nosa.

Środki ostrożności i przeciwwskazania związane ze stosowaniem:

Ciepłych kąpieeli całego ciała w roztworach soli mineralnych, podobnie jak ciepłej kąpieeli wodnej, nie należy stosować w przypadkach, gdy ze względu na ogólny stan organizmu niewskazane jest narażenie na działanie silnych bodźców.

Przeciwwskazane jest stosowanie leku w ostrych stanach zapalnych, niewydolność krążenia, chorobach naczyń wieńcowych, wadach serca, zaburzeniach rytmu serca, chorobach nowotworowych, czynnych procesach gruźliczych, nadciśnieniu tętniczym, psychopatii, nadczynności tarczycy.

Nie zaleca się inhalacji roztworami soli we wszystkich ostrych stanach chorobowych dróg oddechowych.

Interakcje: Nie stwierdzono.

Ciąża i karmienie piersią: Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.
Nie stosować w okresie ciąży.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn: Nie stwierdzono wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie maszyn.

Dawkowanie i sposób stosowania;

Do użytku zewnętrznego w postaci roztworu wodnego do kąpieeli i inhalacji.

Kąpiele (temperatura 35-36°C)

Zaleca się stosowanie roztworu o stężeniu od 1% do 3% (1-3 kg soli na 100 l wody), wyjątkowo w chorobach skóry 6% (6 kg soli na 100 l wody). Leczenie należy rozpocząć od niższego stężenia, a następnie stopniowo zwiększać stężenie. Dla dzieci stężenie roztworu do kąpieeli nie powinno być większe niż 1,5% (1,5 kg na 100 l wody), wanna zawiera około 100 l wody.

Inhalacje (temperatura 37°C)

Zaleca się stosowanie roztworu o stężeniu do 3% (30 g na 1 l wody).

Inhalacje wykonuje się przez bezpośrednie wdychanie oparów roztworu lub przy użyciu inhalatora (łyżka stołowa zawiera około 10 g soli).

Zgłaszanie działań niepożądanych:

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniарce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Pozwolenie nr R/3319

OTC- Lek wydawany bez recepty

Nr serii:

((Logo firmy))

Termin ważności:

5	9	0	9	9	9	0	3	3	1	9	2	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Podmiot odpowiedzialny:

Zakład Przeróbki Solanek Jodowo-Bromowych

„SALCO” Spółka Jawna

32-744 Łapczyca 445 tel. 16 6127519

e-mail: biuro@salco.pl www.salco.pl

Informacja podana brajlem:

BOCHEŃSKA LECZNICZA SÓL JODOWO – BROMOWA

Data zatwierdzenia tekstu:

OZNAKOWANIE OPAKOWANIA BEZPOŚREDNIEGO (worek 20 kg)

BOCHEŃSKA LECZNICZA SÓL JODOWO – BROMOWA sól jodowo – bromowa

Produkt leczniczy zawiera sól jodowo – bromową, w tym:

jodki - nie mniej niż 0,03%; bromki- nie mniej niż 0,05% ; wapń- nie więcej niż 1,5% ; magnez- nie więcej niż 0,8% ; sód -nie mniej niż 32% ; potas- nie więcej niż 0,5%; chlorki- nie mniej niż 55% ; żelazo -nie więcej niż 0,001% ; woda- nie więcej niż 18% ; składniki nierozpuszczalne w wodzie -nie więcej niż 0,5%

Postać farmaceutyczna:

proszek krystaliczny

Zawartość opakowania:

1 kg

Sposób działania:

Ciepła kąpiel mineralna działa kompleksowo poprzez czynniki termiczne, mechaniczne (ciśnienie hydrostatyczne) i chemiczne.

Odpowiednie stężenie roztworu i optymalna temperatura (35-36°C) działają zarówno na skórę i błony śluzowe, jak i pośrednio na cały organizm.

Odpowiednia temperatura i składniki mineralne kąpeli powodują rozpułchnienie naskórka, umożliwiając wchłanianie składników mineralnych. Powstający na skórze „płaszcz solny” dostarcza długotrwałych bodźców osmotycznych, działa antyseptycznie i wspomaga leczenie chorób skóry. Kąpiele solankowe wywierają działanie przegrzewające silniejsze niż kąpiele wodne, pobudzając procesy biochemiczne w trakcie i przez dłuższy czas po kąpeli. W wyniku serii kąpeli obserwuje się normalizację czynności wegetatywnego układu nerwowego i układu przysadka-nadnercza, co zmniejsza nasilenie objawów schorzeń reumatycznych. Zmniejsza się przewodnictwo skóry, dolegliwości neuralgiczne ulegają osłabieniu, zmniejsza się nerwowość i pobudzenie.

Kąpiele i inhalacje ułatwiają likwidację ognisk zapalnych, działają przeciwzapalnie i odkażająco. Podczas inhalacji rozrzedzeniu ulega śluz zalegający w drogach oddechowych. Roztwór soli jodowo-bromowej działa przeciwzapalnie i antyseptycznie. Związki jodu mogą wpływać na gruczoł tarczowy.

Wskazania do stosowania:

Kąpiele:

- w schorzeniach reumatycznych: reumatoidalne zapalenie stawów, zeszywniające zapalenie stawów kręgosłupa, choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa i stawów, zapalenie reumatyczne mięśni i ścięgien, zapalenie korzonków nerwowych, schorzenia pourazowe narządu ruchu, rekonwalescencja;
- w chorobach przemiany materii: dnawe zapalenie stawów, profilaktyka niedoczynności tarczycy;
- w ginekologii: przewlekłe zapalenie przydatków;
- w dermatologii, jako środek pomocniczy;

- łuszczyca, rybia łuska, wyprysk przewlekły, nerwice naczyniowe;
- w chorobach układu naczyniowego:
zaburzenia ukrwienia obwodowego kończyn.

Kąpiele można stosować w stanach zmęczenia, w celu poprawy ogólnej kondycji fizycznej.

Inhalacje (i kąpiele)

- przewlekłe choroby dróg oddechowych i zatok obocznych nosa.

Środki ostrożności i przeciwwskazania związane ze stosowaniem:

Ciepłych kąpieeli całego ciała w roztworach soli mineralnych, podobnie jak ciepłej kąpieeli wodnej, nie należy stosować w przypadkach, gdy ze względu na ogólny stan organizmu niewskazane jest narażenie na działanie silnych bodźców.

Przeciwwskazane jest stosowanie leku w ostrych stanach zapalnych, niewydolność krążenia, chorobach naczyń wieńcowych, wadach serca, zaburzeniach rytmu serca, chorobach nowotworowych, czynnych procesach gruźliczych, nadciśnieniu tętniczym, psychopatii, nadczynności tarczycy.

Nie zaleca się inhalacji roztworami soli we wszystkich ostrych stanach chorobowych dróg oddechowych.

Interakcje: Nie stwierdzono.

Ciąża i karmienie piersią: Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.
Nie stosować w okresie ciąży.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn: Nie stwierdzono wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie maszyn.

Dawkowanie i sposób stosowania;

Do użytku zewnętrznego w postaci roztworu wodnego do kąpieeli i inhalacji.

Kąpiele (temperatura 35-36°C)

Zaleca się stosowanie roztworu o stężeniu od 1% do 3% (1-3 kg soli na 100 l wody), wyjątkowo w chorobach skóry 6% (6 kg soli na 100 l wody). Leczenie należy rozpocząć od niższego stężenia, a następnie stopniowo zwiększać stężenie. Dla dzieci stężenie roztworu do kąpieeli nie powinno być większe niż 1,5% (1,5 kg na 100 l wody), wanna zawiera około 100 l wody.

Inhalacje (temperatura 37°C)

Zaleca się stosowanie roztworu o stężeniu do 3% (30 g na 1 l wody).

Inhalacje wykonuje się przez bezpośrednie wdychanie oparów roztworu lub przy użyciu inhalatora (łyżka stołowa zawiera około 10 g soli).

Zgłaszanie działań niepożądanych:

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce.
Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Pozwolenie nr R/3319

OTC- Lek wydawany bez recepty

Nr serii:

((Logo firmy))

Termin ważności:

5	9	0	9	9	9	0	3	3	1	9	3	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Podmiot odpowiedzialny:

Zakład Przeróbki Solanek Jodowo-Bromowych

„SALCO” Spółka Jawna

32-744 Łapczyca 445 tel. 16 6127519

e-mail: biuro@salco.pl www.salco.pl

Informacja podana brajlem:

BOCHEŃSKA LECZNICZA SÓL JODOWO – BROMOWA

Data zatwierdzenia tekstu:

OZNAKOWANIE OPAKOWANIA ZEWNĘTRZNEGO
(pojemnik ceramiczny 1 kg)

BOCHEŃSKA LECZNICZA SÓL JODOWO – BROMOWA
proszek krystaliczny

Produkt leczniczy zawiera sól jodowo – bromową.

Postać farmaceutyczna: proszek krystaliczny

Zawartość opakowania: 1 kg

Sposób i droga podania: na skórę i wziewna.

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Termin ważności:

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Podmiot odpowiedzialny:

Zakład Przeróbki Solanek Jodowo-Bromowych

„SALCO” Spółka Jawna

32-744 Łapczyca 445 tel. 16 6127519

e-mail: biuro@salco.pl www.salco.pl

Pozwolenie nr R/3319

Numer serii:

OTC- Lek wydawany bez recepty.

Szczegółowe informacje na opakowaniu bezpośrednim.

5	9	0	9	9	9	0	0	7	3	2	5	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Informacja podana brajlem:

BOCHEŃSKA LECZNICZA SÓL JODOWO – BROMOWA