

## INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

Pudełko tekturowe

### 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Clotidal MAX, 500 mg, tabletki dopochwowa

*Clotrimazolum*

### 2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

**Skład:** Każda tabletki dopochwowa zawiera 500 mg klotrymazolu.

### 3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

*Substancje pomocnicze:* laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, skrobia ziemniaczana, kwas adypinowy, sodu wodorowęglan, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna, sodu laurylosiarczan.

### 4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

tabletki dopochwowa

1 tabletki dopochwowa

Kod: 5909991460907

### 5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

**Dawkowanie i droga podania:**

Stosować dopochwowo.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

### 6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

### 7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Patrz punkt 2 ulotki, w jakich sytuacjach skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku Clotidal MAX.

### 8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP):

## 9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

**Przechowywanie:** Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania produktu leczniczego. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

## 10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

## 11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

**Podmiot odpowiedzialny:**

US Pharmacia Sp. z o.o.  
ul. Ziębicka 40  
50-507 Wrocław

(logo)

## 12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 26549

## 13. NUMER SERII

Nr serii (Lot):

## 14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty.

## 15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Clotidal MAX leczy grzybicę pochwy i żeńskich zewnętrznych narządów płciowych. Leczy objawy zakażenia grzybiczego, w tym:

- upławy
- ból i pieczenie
- swędzenie.

Jednorazowa aplikacja.

Lek stosuje się w dawce jednorazowej - 1 tabletkę głęboko dopochwowo przed snem.

Lek przeznaczony jest do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku od 16 lat. Dalsze informacje - patrz ulotka.

**16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A**

clotidal max 500 mg

**17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D**

Nie dotyczy.

**18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA**

Nie dotyczy.