

**INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH ORAZ
OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH**

PUDEŁKO TEKTUROWE

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Coldrex Complex Grip
Paracetamolum + Guaiifenesinum + Phenylephrini hydrochloridum
500 mg + 200 mg + 10 mg, proszek do sporządzania roztworu doustnego

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każda saszetka zawiera:
500 mg paracetamolu
200 mg gwajafenezyny
10 mg fenylefryny chlorowodorku

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Ponadto zawiera: sacharozę, aspartam (E951), sodu cytrynian i sodu cyklaminian (E 952).

W celu uzyskania bliższych informacji należy zapoznać się z treścią ulotki.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Proszek do sporządzania roztworu doustnego

5 saszetek Kod : 5909991031145

6 saszetek Kod : 5909991107444

10 saszetek Kod : 5909991031152

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Do stosowania doustnego po rozpuszczeniu zawartości jednej saszetki w standardowym kubku gorącej, lecz nie wrzącej wody (około 250 ml). Pozostawić do ostygnięcia i uzyskania temperatury umożliwiającej wypicie. Wypić roztwór w ciągu 1½ godziny.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

**6. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO
W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI**

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Nie podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

Nie przekraczać zalecanej dawki. Jeśli objawy utrzymują się dłużej niż 3 dni lub nasiliły się, należy zasięgnąć porady lekarza.

Zawiera paracetamol.

Nie stosować z innymi lekami zawierającymi paracetamol. W przypadku przedawkowania należy natychmiast skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli pacjent czuje się dobrze.

Nie stosować z innymi lekami na przeziębienie, grypę lub obkurczającymi naczynia.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP):

Nie stosować leku po upływie terminu umieszczonego na opakowaniu.

9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny: Perrigo Poland Sp. z o.o., ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa

<logo podmiotu odpowiedzialnego>

12. NUMER (-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 20786

13. NUMER SERII

Nr serii (Lot):

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Krótkotrwałe, doraźne łagodzenie objawów towarzyszących przeziębieniu i grypie, takich jak ból, ból głowy, nieżyt nosa, ból gardła, dreszcze i gorączka oraz ułatwianie odkrztuszania przy kaszlu produktywnym.

Dorośli, pacjenci w podeszłym wieku i młodzież w wieku 12 lat i powyżej:
1 saszetka co 4 godziny w razie potrzeby. Nie przekraczać 4 saszetek (4 dawek) w ciągu doby. Nie przyjmować częściej niż co 4 godziny.

Łagodzi objawy przeziębienia i grypy:

- ból
- ból głowy
- nieżyt nosa
- ból gardła
- dreszcze i gorączka
- kaszel mokry

Smak cytrynowo-miętowy

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

Coldrex Complex Grip

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

<Nie dotyczy.>

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

<Nie dotyczy.>

**INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH ORAZ
OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH**

SASZETKA

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA PODANIA

Coldrex Complex Grip

Paracetamolum + Guaifenesinum + Phenylephrini hydrochloridum

500 mg + 200 mg + 10 mg, proszek do sporządzania roztworu doustnego

Krótkotrwałe, doraźne łagodzenie objawów towarzyszących przeziębieniu i grypie, takich jak ból, ból głowy, nieżyt nosa, ból gardła, dreszcze i gorączka oraz ułatwianie odkrztuszania przy kaszlu produktywnym.

2. SPOSÓB PODAWANIA

Jak stosować lek:

Do stosowania doustnego po rozpuszczeniu zawartości jednej saszetki w standardowym kubku gorącej, lecz nie wrzącej wody (około 250 ml). Pozostawić do ostygnięcia i uzyskania temperatury umożliwiającej wypicie. Wypić roztwór w ciągu 1½ godziny.

Dawkowanie:

Dorośli, pacjenci w podeszłym wieku i młodzież od 12 roku życia:

1 saszetka co 4 godziny w razie potrzeby. Nie przekraczać 4 saszetek (4 dawek) w ciągu doby. Nie przyjmować częściej niż co 4 godziny.

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP

4. NUMER SERII

Lot:

**5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY
JEDNOSTEK SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA**

4,4 g

6. INNE

Nie podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

Nie przekraczać zalecanej dawki. Jeśli objawy utrzymują się dłużej niż 3 dni lub nasiliły się, należy zasięgnąć porady lekarza.

Zawiera paracetamol.

Nie stosować z innymi lekami zawierającymi paracetamol. W przypadku przedawkowania należy natychmiast skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli pacjent czuje się dobrze.

Nie stosować z innymi lekami na przeziębienie, grypę lub obkurczającymi naczynia. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Składniki:

Każda saszetka zawiera substancje czynne: 500 mg paracetamolu, 200 mg gwajafenezyny i 10 mg fenylefryny chlorowodorku. Ponadto zawiera: sacharozę, aspartam (E951), sodu cytrynian i sodu cyklaminian (E 952) - dodatkowe informacje patrz ulotka.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie stosować leku po upływie terminu umieszczonego na opakowaniu.

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Podmiot odpowiedzialny: Perrigo Poland Sp. z o.o., ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa

Pozwolenie nr: 20786

<logo podmiotu odpowiedzialnego>