

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH**PUDEŁKO TEKSTUROWE****1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO****DIH****500 mg, tabletki powlekane***Diosminum***2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ****Skład**

1 tabletki powlekana zawiera 500 mg zmikronizowanej diosminy

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

oraz substancje pomocnicze. Dodatkowe informacje – patrz ulotka dla pacjenta.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Tabletka powlekana

30 tabletek powlekanych Kod: 5909990723102

60 tabletek powlekanych Kod: 5909990723195

90 tabletek powlekanych Kod: 5904055003311

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA**Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.****Sposób i droga podania**

Podanie doustne.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE**8. TERMIN WAŻNOŚCI****Termin ważności (Tw)****9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA**

Warunki przechowywania

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.
51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

{Logo podmiotu odpowiedzialnego}

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 15805

13. NUMER SERII

Numer serii (S)

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

- bóle i nocne kurcze
- ciężkie i zmęczone nogi
- obrzęki nóg
- żylaki nóg
- owrzodzenia żyłne
- hemoroidy

Wskazania do stosowania

- Objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych:
 - bóle i nocne kurcze nóg,
 - uczucie pieczenia nóg,
 - uczucie zimnych nóg,
 - uczucie ciężkości, zmęczenia, dyskomfortu lub niespokojnych nóg,
 - żylaki kończyn dolnych,
 - owrzodzenia żyłne,
 - pajączki naczyniowe,
 - obrzęki nóg,
 - świąd i parestezje,
 - zaczerwienienie lub zasinienie skóry.
- Objawowe leczenie żylaków odbytu (hemoroidy).

- Zazwyczaj stosowana dawka to dwie tabletki na dobę podczas posiłku, tj. po 1 tabletkę rano i wieczorem.
- Jedynie w przypadkach zaostrzenia dolegliwości spowodowanych żylakami odbytu zaleca się podawanie większych dawek do 6 tabletek na dobę, tj. 2 razy na dobę po 3 tabletki przez 4 dni, a przez kolejne 3 dni zmniejszenie dawki: 4 tabletki na dobę, tj. 2 razy na dobę po 2 tabletki.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

dih

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.