

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

Pudełko tekturowe

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Aleric Deslo Active, 5 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
Desloratadinum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

1 tabletki ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 5 mg desloratadyny.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Lek zawiera także aspartam (E 951).

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

5 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej – Kod 5909991013288
6 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej – Kod 5909991013295
10 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej – Kod: 5909991013301
20 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej – Kod: 5904569251291
30 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej – Kod: 5904569251307

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doustne.
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP):

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny

US Pharmacia Sp. z o.o.,
ul. Ziębicka 40,
50-507 Wrocław
<logo firmy USP Zdrowie Sp. z o.o.>

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 20564

13. NUMER SERII

Nr serii (Lot):

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

- Lek przeciwalergiczny
- 1 tabletkę raz na dobę (24h)
- Bez konieczności popijania

Dawkowanie i sposób podania:

Dorośli i młodzież w wieku od 12 lat: 1 tabletkę 5 mg raz na dobę.

Blister należy ostrożnie otworzyć bezpośrednio przed użyciem. Wyjąć tabletkę i umieścić w jamie ustnej, gdzie ulega natychmiastowemu rozpadowi. Woda lub inne płyny nie są potrzebne, aby połknąć dawkę. Można przyjmować niezależnie od posiłku.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

aleric deslo active 5 mg