

**INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH****PUDEŁKO TEKTUROWE****1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

Flurbiprofen Geiser, 8,75 mg, pastylki, twarde, o smaku cytrynowy

*Flurbiprofenum*

**2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ**

Każda pastylka twarda zawiera 8,75 mg flurbiprofenu.

**3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH**

Zawiera także:

Izomalt

Maltitol ciekły

Acesulfam potasowy (E 950)

Makrogol 300

Potasu wodorotlenek

Aromat cytrynowy

Lewomentol

Dodatkowe informacje – patrz ulotka.

**4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

pastylki twarde

8 pastylek twardych                      kod:

12 pastylek twardych                      kod:

16 pastylek twardych                      kod:

20 pastylek twardych                      kod:

24 pastylki twarde                      kod:

**5. SPOSÓB I DROGA PODANIA**

Podanie na śluzówkę jamy ustnej.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

**6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI**

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

**7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE**

**8. TERMIN WAŻNOŚCI**

Termin ważności (EXP):

**9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA**

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

**10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**

**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

Geiser Pharma S.L.  
Polígono Mutilva, Calle E, 5 Bajo  
31192 Multiva-Aranguren Navarra  
Hiszpania

**12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

Pozwolenie nr

**13. NUMER SERII**

Nr serii (Lot):

**14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI**

OTC - Lek wydawany bez recepty.

**15. INSTRUKCJA UŻYCIA**

Do krótkotrwałego łagodzenia objawów stanu zapalnego gardła, takich jak ból gardła, podrażnienie i obrzęk oraz trudności w przełykaniu u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat.

Dodatkowe informacje – patrz ulotka.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: ssać jedną pastylkę co 3 do 6 godzin, w razie potrzeby.

Nie stosować więcej niż 5 pastylek w okresie 24 godzin.

Nie należy przyjmować leku dłużej niż 3 dni.

**16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A**

Flurbiprofen Geiser, 8,75 mg, pastylki, twarde, o smaku cytrynowy

**17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D**

Nie dotyczy.

**18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA**

Nie dotyczy.

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH**

**BLISTER**

**1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

Flurbiprofen Geiser, 8,75 mg, pastylki, twarde, o smaku cytrynowy

*Flurbiprofenum*

**2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

Geiser Pharma S.L.  
Polígono Mutilva, Calle E, 5 Bajo  
31192 Multiva-Aranguren Navarra  
Hiszpania

**3. TERMIN WAŻNOŚCI**

EXP:

**4. NUMER SERII**

Lot:

**5. INNE**