

## INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

### TEKTUROWE PUDELKO

#### 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

ALTACET, 10 mg/g, żel

*Aluminii acetotartras*

#### 2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

**Skład:**

substancja czynna: glinu octanowinian 10 mg/g.

#### 3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

**Substancje pomocnicze:** etanol 96%, lewomentol, metylu parahydroksybenzoesan, karbomer, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona. Więcej informacji – patrz ulotka dla pacjenta.

#### 4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

żel

40 g    Kod: 5909990015269

75 g    Kod: 5909991000011

130 g    Kod: 7622436118277

#### 5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Podanie na skórę.

#### 6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

#### 7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

#### 8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności:

Leku nie należy stosować po upływie terminu ważności.

#### 9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA

**Przechowywanie:**

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

**10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**

**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

**Podmiot odpowiedzialny:**

Lek S.A.  
ul. Podlipie 16,  
95-010, Stryków

**12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

Pozwolenie nr 10000

**13. NUMER SERII**

Numer serii:

**14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI**

OTC - lek wydawany bez przepisu lekarza.

**15. INSTRUKCJA UŻYCIA**

**Sposób użycia:**

**Dorośli i dzieci w wieku powyżej 3 lat:**

Altacet należy stosować na czystą, suchą skórę w bolących miejscach od 3 do 4 razy na dobę, w odstępach kilkugodzinnych, najlepiej w postaci okładów.

Nie należy stosować leku w opatrunku okluzyjnym lub owijać okładów folią. Można stosować wyłącznie okłady wysychające.

Ostrożnie stosować u dzieci.

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat.

**Wskazania do stosowania:**

Altacet stosuje się miejscowo na skórę w stłuczeniach, obrzękach stawowych i pourazowych oraz w obrzękach spowodowanych oparzeniami I°.

Lek na obrzęki i stłuczenia

Zmniejsza obrzęk i łagodzi ból

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 3 lat

**16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A**

Altacet żel

**17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D**

Nie dotyczy.

**18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA**

Nie dotyczy.

## INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

TUBA

### 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

ALTACET, 10 mg/g, żel

*Aluminii acetotartras*

### 2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

**Skład:**

substancja czynna: glinu octanowinian 10 mg/g.

### 3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

**Substancje pomocnicze:** etanol 96%, lewomentol, metylu parahydroksybenzoesan, karbomer, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona.

### 4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

żel

40 g

75 g

130 g

### 5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

**Podanie na skórę.**

### 6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

### 7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

### 8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności:

### 9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA

**Przechowywanie:**

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

**10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**

**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

**Podmiot odpowiedzialny:**

Lek S.A.  
ul. Podlipie 16  
95-010 Stryków

**12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

Pozwolenie nr 10000

**13. NUMER SERII**

Numer serii:

**14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI**

OTC - lek wydawany bez przepisu lekarza.

**15. INSTRUKCJA UŻYCIA**

**Sposób użycia:**

**Dorośli i dzieci w wieku powyżej 3 lat:**

Altacet należy stosować na czystą, suchą skórę w bolących miejscach od 3 do 4 razy na dobę, w odstępach kilkugodzinnych, najlepiej w postaci okładów.

Nie należy stosować leku w opatrunku okluzyjnym lub owijać okładów folią. Można stosować wyłącznie okłady wysychające.

Ostrożnie stosować u dzieci.

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat.

Lek na obrzęki i stłuczenia

Zmniejsza obrzęk i łagodzi ból

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 3 lat

**16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A**

**17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D**

**18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA**