

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ketesse SL, 25 mg, granulat do sporządzania roztworu doustnego
Dexketoprofenum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każda saszetka zawiera 25 mg deksketoprofenu (w postaci deksketoprofenu z trometamolem).

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Zawiera sacharozę.
Aby uzyskać dalsze informacje należy zapoznać się z treścią ulotki.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Granulat do sporządzania roztworu doustnego.

10 saszetek	Kod EAN: 5909990877942
20 saszetek	Kod EAN: 5909990877959
30 saszetek	Kod EAN: 5909990877966

5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA

Podanie doustne.
Należy rozpuścić zawartość saszetki w szklance wody i dobrze rozmieszać w celu ułatwienia rozpuszczenia. Uzyskany roztwór należy wypić natychmiast po przygotowaniu.
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP):

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Menarini International Operations Luxembourg S.A.
1, Avenue de la Gare
L-1611 Luxembourg
Luksemburg

Logo podmiotu odpowiedzialnego

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Nr pozwolenia: 18394

13. NUMER SERII

14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Stosowany u osób dorosłych do leczenia bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego np. bólu mięśni lub stawów, bolesnego miesiączkowania, bólu zębów.
Zalecana dawka dobową to zwykle 1 saszetka co 8 godzin, jednak nie więcej niż 3 saszetki na dobę. Jeśli po upływie 3 do 4 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Kettese SL 25 mg

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH
BEZPOŚREDNICH**

{SASZETKA}

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA PODANIA

Kettese SL, 25 mg, granulat do sporządzania roztworu doustnego
Dexketoprofenum
Podanie doustne.

2. SPOSÓB PODAWANIA

Sposób podawania: należy rozpuścić zawartość saszetki w szklance wody i dobrze rozmieszać w celu ułatwienia rozpuszczenia. Uzyskany roztwór należy wypić natychmiast po przygotowaniu.

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP:

4. NUMER SERII

Lot:

**5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY
JEDNOSTEK**

6. INNE

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Każda saszetka zawiera 25 mg deksketoprofenu (w postaci deksketoprofenu z trometamolem).
Zawiera sacharozę.

Menarini International Operations Luxembourg S.A.
1, Avenue de la Gare
L-1611 Luxembourg
Luksemburg

Logo podmiotu odpowiedzialnego