

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH**PUDEŁKO TEKTUROWE NA BUTELKĘ (125 mg/5 ml)****1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

Klabax 125 mg/5 ml
Granulat do sporządzania zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml
(Clarithromycinum)

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

5 ml przygotowanej zawiesiny zawiera substancję czynną: 125 mg klarytromycyny

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Zawiera substancje pomocnicze, m. in. sacharozę i aspartam.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Granulat do sporządzania zawiesiny doustnej

Butelka 60 ml

kod: 5909990620647

Butelka 100ml

kod: 5909990620654

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA**6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI**

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Dawkowanie: ściśle według zaleceń lekarza.
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
NIE NALEŻY PRZEKRACZAĆ ZALECONEJ DAWKI

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności:

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Proszek nie wymaga specjalnych warunków przechowywania. Przygotowanej zawiesiny nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie przechowywać w lodówce, ani nie zamrażać. Przechowywać w szczelnie zamkniętej butelce.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

Pozostałości niewykorzystanego produktu należy wyrzucić po 14 dniach

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Ranbaxy (Poland) Sp. z o. o.
ul. Kubickiego 11
02-954 Warszawa

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Nr pozwolenia 12405

13. NUMER SERII

Nr serii

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

Rp - Lek wydawany na receptę.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

PRZED KAŻDYM UŻYCIEM NALEŻY DOBRZE WSTRZĄSNAĆ BUTELKĘ Z ZAWIESINĄ.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

Klabax 125 mg/5 ml

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Obejmuje kod 2D będący nośnikiem niepowtarzalnego identyfikatora.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

PC:

SN:
NN:

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

Naklejka na butelkę (125 mg/5 ml)

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Klabax 125 mg/5 ml
Granulat do sporządzania zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml
(Clarithromycinum)

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

5 ml przygotowanej zawiesiny zawiera substancję czynną: 125 mg klarytromycyny

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Zawiera substancje pomocnicze, m. in. sacharozę i aspartam.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Butelka 60 ml

Butelka 100 ml

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Dawkowanie: ściśle według zaleceń lekarza.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

NIE NALEŻY PRZEKRACZAĆ ZALECONEJ DAWKI

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności:

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Proszek nie wymaga specjalnych warunków przechowywania. Przygotowanej zawiesiny nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie przechowywać w lodówce, ani nie zamrażać. Przechowywać w szczelnie zamkniętej butelce

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE
--

Pozostałości niewykorzystanego produktu należy wyrzucić po 14 dniach

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO
--

Ranbaxy (Poland) Sp. z o. o.
ul. Kubickiego 11
02-954 Warszawa

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Nr pozwolenia12405

13. NUMER SERII

Nr serii

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

PRZED KAŻDYM UŻYCIEM NALEŻY DOBRZE WSTRZĄSNAĆ BUTELKĘ Z ZAWIESINĄ.