

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

PUDEŁKO TEKTUROWE NA BUTELKĘ (250 mg/5 ml)

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Klabax 250 mg/5 ml
(Clarithromycinum)
Granulat do sporządzania zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

5 ml przygotowanej zawiesiny zawiera substancję czynną: 250 mg klarytromycyny

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Zawiera substancje pomocnicze, m. in. sacharozę i aspartam.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Granulat do sporządzania zawiesiny doustnej

Butelka 60 ml kod: 5909990620661

Butelka 100ml kod: 5909990620678

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Dawkowanie: ściśle według zaleceń lekarza.
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
NIE NALEŻY PRZEKRACZAĆ ZALECONEJ DAWKI

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności:

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Proszek nie wymaga specjalnych warunków przechowywania. Przygotowanej zawiesiny nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie przechowywać w lodówce, ani nie zamrażać. Przechowywać w szczelnie zamkniętej butelce.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

Pozostałości niewykorzystanego produktu należy wyrzucić po 14 dniach.

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Ranbaxy (Poland) Sp. z o. o.
ul. Kubickiego 11
02-954 Warszawa

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Nr pozwolenia 12404

13. NUMER SERII

Nr serii

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

Rp - Lek wydawany na receptę.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

PRZED KAŻDYM UŻYCIEM NALEŻY DOBRZE WSTRZĄSNAĆ BUTELKĘ Z ZAWIESINĄ.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

Klabax 250 mg/5 ml

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Obejmuje kod 2D będący nośnikiem niepowtarzalnego identyfikatora.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

PC:
SN:
NN:

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

Naklejka na butelkę (250 mg/5 ml)

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Klabax 125 mg/5 ml
(Clarithromycinum)
Granulat do sporządzania zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

5 ml przygotowanej zawiesiny zawiera substancję czynną: 250 mg klarytromycyny

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Zawiera substancje pomocnicze, m. in. sacharozę i aspartam.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Butelka 60 ml

Butelka 100 ml

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Dawkowanie: ściśle według zaleceń lekarza.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
NIE NALEŻY PRZEKRACZAĆ ZALECONEJ DAWKI

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności:

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Proszek nie wymaga specjalnych warunków przechowywania. Przygotowanej zawiesiny nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie przechowywać w lodówce, ani nie zamrażać. Przechowywać w szczelnie zamkniętej butelce.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE
--

Pozostałości niewykorzystanego produktu należy wyrzucić po 14 dniach.

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO
--

Ranbaxy (Poland) Sp. z o. o.
ul. Kubickiego 11
02-954 Warszawa

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Nr pozwolenia 12404

13. NUMER SERII

Nr serii

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

PRZED KAŻDYM UŻYCIEM NALEŻY DOBRZE WSTRZĄSNAĆ BUTELKĘ Z ZAWIESINĄ.