

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM**TEKTUROWE PUDELKO****1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

Lakcid Intima, kapsułki dopochwowe, twarde
pałeczki *Lactobacillus gasseri* DSM 14869
pałeczki *Lactobacillus rhamnosus* DSM 14870

nie mniej niż 10^8 CFU*

nie mniej niż 10^8 CFU*

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)

Skład:

Jedna kapsułka zawiera:

pałeczki *Lactobacillus gasseri* DSM 14869

nie mniej niż 10^8 CFU*

pałeczki *Lactobacillus rhamnosus* DSM 14870

nie mniej niż 10^8 CFU*

*CFU (ang. *Colony Forming Unit*) - jednostka tworząca kolonię

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Substancje pomocnicze: laktytol jednowodny, skrobia kukurydziana, guma ksantan, glukoza bezwodna, magnezu stearynian; osłonka kapsułki: żelatyna, tytanu dwutlenek (E 171).

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kapsułki dopochwowe, twarde

8 kapsułek dopochwowych

Kod: 5391520946028

10 kapsułek dopochwowych

Kod: 5909990647064

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Do stosowania dopochwowego.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE**8. TERMIN WAŻNOŚCI**

Termin ważności (EXP):

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

Podmiot odpowiedzialny:
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
ul. Pelplińska 19
83-200 Starogard Gdański
(logo) POLPHARMA

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 14621

13. NUMER SERII

Nr serii (LOT):

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Przywraca lub utrzymuje prawidłową florę bakteryjną pochwy.

Wskazania do stosowania:

Lacid Intima zaleca się stosować w celu utrzymania lub przywrócenia prawidłowej flory bakteryjnej pochwy.

Dawkowanie:

Dorośli i młodzież w wieku 16 lat i powyżej

Profilaktycznie: jedna kapsułka na dobę (przed snem) przez 4-6 dni, dopochwowo. U kobiet miesiączkujących - po miesiączce.

Po antybiotykoterapii: jedna kapsułka na dobę (przed snem) przez 6-8 dni, dopochwowo.

Dzieci i młodzież

U dziewcząt w wieku od 12 do 16 lat (które rozpoczęły miesiączkowanie) lek można stosować po zaleceniu przez lekarza, w takich samych dawkach jak u dorosłych.

Pałeczki kwasu mlekowego stosowane miejscowo, dzięki swym właściwościom wpływają na równowagę mikrobiologiczną ograniczając rozwój mikroorganizmów chorobotwórczych, ponieważ utrzymują odpowiednie kwaśne pH pochwy i mogą redukować objawy takie jak świąd, pieczenie,

upławy oraz nieprzyjemny zapach.

- POWSTRZYMUJE namnażanie patologicznych bakterii i drożdżaków powodujących bakteryjne, grzybicze i mieszane zapalenia pochwy.
- REDUKUJE świąd, pieczenie, upławy i nieprzyjemny zapach towarzyszące zapaleniu pochwy.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

lakcid intima

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D
--

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH
BEZPOŚREDNICH**

POJEMNIK ALUMINIOWY

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA PODANIA

Lakcid Intima, kapsułki dopochwowe, twarde

2. SPOSÓB PODAWANIA

3. TERMIN WAŻNOŚCI

4. NUMER SERII

**5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY
JEDNOSTEK**

8 kapsułek dopochwowych
10 kapsułek dopochwowych

6. INNE

Jedna kapsułka zawiera:

pałeczki *Lactobacillus gasseri* DSM 14869

nie mniej niż 10^8 CFU*

pałeczki *Lactobacillus rhamnosus* DSM 14870

nie mniej niż 10^8 CFU*

*CFU (ang. *Colony Forming Unit*) - jednostka tworząca kolonię

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

EXP/LOT patrz na spodzie opakowania