

**INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH****TEKTUROWE PUDEŁKO****1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

Acard Cor, 75 mg, tabletki dojelitowe

*Acidum acetylsalicylicum*

**2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ**

Każda tabletki dojelitowa zawiera 75 mg kwasu acetylosalicylowego.

**3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH**

Jedna tabletki zawiera 0,18 mg sodu. Szczegółowe informacje, patrz ulotka.

**4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

Tabletki dojelitowa

30 tabletek dojelitowych	Kod: 5909991349851
60 tabletek dojelitowych	Kod: 5909991349868
90 tabletek dojelitowych	Kod: 5909991349875
120 tabletek dojelitowych	Kod: 5909991349882

**5. SPOSÓB I DROGA PODANIA**

Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

**6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI**

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

**7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE****8. TERMIN WAŻNOŚCI**

Termin ważności (EXP)

**9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA**

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

**10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE****11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.  
ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański  
(logo) POLPHARMA

**12. NUMER POZWOLENIA NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

Pozwolenie nr: 24325

**13. NUMER SERII**

Nr serii (Lot)

**14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI**

OTC - lek wydawany bez recepty.

**15. INSTRUKCJA UŻYCIA**

Tabletki należy przyjmować doustnie w trakcie lub po posiłku, połykając w całości; popić wystarczającą ilością płynu (pół szklanki wody). Jeśli lekarz nie przepisze inaczej, najczęściej stosuje się 1 do 2 tabletek na dobę.

Opis działania:

Hamuje zlepianie płytek krwi a przez to zmniejsza krzepliwość krwi.

Wskazania:

- zapobieganie zawałowi serca u pacjentów po przebytych zawałach oraz chorobom sercowo-naczyniowym u chorych z niedokrwinną chorobą serca;
- zapobieganie powikłaniom zatorowo-zakrzepowym po zabiegach chirurgicznych;
- zapobieganie udarowi mózgu.

Leku nie stosować u dzieci w wieku poniżej 16 lat.

**16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A**

acard cor 75 mg

**17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D**

Nie dotyczy.

**18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA**

Nie dotyczy.

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH**

**BLISTER**

**1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

Acard Cor, 75 mg, tabletki dojelitowe

*Acidum acetylsalicylicum*

**2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

(logo) POLPHARMA

**3. TERMIN WAŻNOŚCI**

EXP

**4. NUMER SERII**

Lot

**5. INNE**