

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH
PUDEŁKO TEKTUROWE

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

MAGNE B₆ 48 mg Mg²⁺ + 5 mg, tabletki powlekane
Magnesii lactas dihydricus + Pyridoxini hydrochloridum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Skład:

1 tabletkę zawiera jako substancje czynne:
48 mg jonów magnezu w postaci magnezu mleczanu dwuwodnego i 5 mg
pirydoksyny chlorowodoru (witamina B₆)

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

oraz substancje pomocnicze, w tym sacharozę.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

50 tabletek powlekanych kod EAN: 5909990427918
60 tabletek powlekanych kod EAN: 5902502992744

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

**6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU
LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA
DZIECI**

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP):

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić przed światłem.

**10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA
NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z
NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny:
Opella Healthcare Poland Sp. z o.o.
ul. Marcina Kasprzaka 6
01-211 Warszawa

{logo Sanofi}

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 4279

13. NUMER SERII

Nr serii (Lot):

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty.
lek OTC

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Lek jest wskazany do stosowania w niedoborach magnezu.

Dawkowanie w 2-3 dawkach podzielonych:

Dorośli: 6-8 tabletek na dobę

Dzieci od lat 6: 4-6 tabletek na dobę

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

magne b6

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR - KOD 2D

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

BLISTER

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

MAGNE B₆

48 mg Mg²⁺ + 5 mg

tabletki powlekane

Magnesii lactas dihydricus + Pyridoxini hydrochloridum

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Opella Healthcare Poland

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP:

4. NUMER SERII

Lot:

5. INNE

Dawkowanie na dobę w 2-3 dawkach podzielonych:

Dorośli: 6-8 tabletek

Dzieci od lat 6: 4-6 tabletek