

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

PUDEŁKO TEKTUROWE

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Magvit B₆, 48 mg jonów magnezu + 5 mg pirydoksyny chlorowodorku, tabletki dojelitowe
Magnesii lactas + Pyridoxini hydrochloridum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Jedna tabletki zawiera:
substancje czynne: jony magnezu 48 mg (w postaci magnezu mleczanu dwuwodnego)
pirydoksyny chlorowodorek 5 mg (witamina B₆)

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, sacharoza, alkohol poliwinylowy, krzemionka koloidalna uwodniona, talk, magnezu stearynian, kopolimer kwasu metakrylowego (Eudragit L 100-55), tytanu dwutlenek (E171), makrogol 6000, powidon K 25, emulsja silikonowa SE2, sodu wodorotlenek

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Tabletki dojelitowe

20 tabletek dojelitowych	Kod: 5909990462339
30 tabletek dojelitowych	Kod: 5909990462346
50 tabletek dojelitowych	Kod: 5909990462322

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doustne.
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności:

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

Angelini Pharma Polska Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 181B
02-222 Warszawa

<Logo podmiotu odpowiedzialnego>

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 4623

13. NUMER SERII

Numer serii:

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Lek stosować w profilaktyce i leczeniu następstw niedoborów magnezu i (lub) witaminy B6.

Profilaktycznie MAGVIT B₆ stosuje się w stanach przewlekłego zmęczenia fizycznego i psychicznego, podczas nasilonej pracy umysłowej i fizycznej, w sytuacjach wywołujących stres i nadpobudliwość nerwową, w zaburzeniach snu i w depresji nerwowej, w bólach mięśni, w zapobieganiu miażdżycy i zawałom serca.

LEK OTC

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

MAGVIT B6

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D
--

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

BLISTER

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Magvit B₆, 48 mg jonów magnezu + 5 mg pirydoksyny chlorowodorku, tabletki dojelitowe
Magnesii lactas + Pyridoxini hydrochloridum

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

<Logo zawierające skróconą nazwę podmiotu odpowiedzialnego> Angelini Pharma

3. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności:

4. NUMER SERII

Nr serii:

5. INNE