

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

tekturowe pudełko

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Manti

200 mg + 200 mg + 25 mg

tabletki do rozgryzania i żucia

(*Aluminii hydroxidum*+ *Magnesii hydroxidum*+ *Simeticonum*)

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-YCH)

Skład 1 tabletki zawiera: *substancje czynne*: glinu wodorotlenek 200 mg, magnezu wodorotlenek 200 mg, symetykon 25 mg

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

oraz *substancje pomocnicze*, w tym: sorbitol (E 420), aspartam (E 951), glukozę (pochodzącą z maltodekstryny).

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Tabletki do rozgryzania i żucia

2 tabletki kod 5907377139355

4 tabletki kod 5907377139362

6 tabletek kod: 5909990765294

8 tabletek kod: 5909990049202

10 tabletek kod: 5909990436217

10 tabletek (2 blistry po 5 szt.) kod: 5909990049196

16 tabletek kod: 5907377139089

20 tabletek kod: 5909990436224

30 tabletek kod: 5909990436248

32 tabletki kod: 5907377139096

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Ostrzeżenia

Lek może zaburzać wchłanianie wielu leków. Należy zachować co najmniej 2-godzinny odstęp pomiędzy stosowaniem Manti i innych leków doustnych.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności:

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywanie Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny

US Pharmacia Sp. z o.o.,
ul. Ziębicka 40,
50-507 Wrocław
{logotyp podmiotu}

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 4362

13. NUMER SERII

Numer serii:

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

smak miętowy

Wskazania

Zgaga oraz wzdęcia i bóle brzucha związane z nadmiernym wytwarzaniem gazów w jelitach występujące w przebiegu:

- niestrawności,
- nadkwaśności,
- zapalenia błony śluzowej żołądka,
- choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy.

Zgaga

Nadkwaśność

Niestrawność

Dawkowanie i droga podania

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat:

pojedyncza dawka: 1 do 3 tabletek między posiłkami, przed snem oraz w czasie wystąpienia dolegliwości żołądkowych; maksymalna dawka dobową: 12 tabletek.

Nie należy połykać tabletek w całości.

Nie stosować maksymalnych dawek dłużej niż 2 tygodnie.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

mani

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy