

## INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

Pudełko tekturowe

### 1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Mastisan PN DC, 300 000 j.m./5 g + 150 000 j.m./5 g, zawiesina dowymieniowa

### 2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

1 tubostrzykawka (5 g) zawiera:

**Substancje czynne:**

Benzylopenicylina prokainowa	300 000 j.m.
Neomycyna (w postaci neomycyny siarczanu)	150 000 j.m.

### 3. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

20 x 5 g

### 4. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło (krowy w okresie zasuszenia)

### 5. WSKAZANIA LECZNICZE

**Wskazania:** Leczenie klinicznych i podklinicznych zapaleń wymienia u krów w okresie zasuszenia, wywołanych przez bakterie wrażliwe na benzylopenicylinę i neomycynę tj., *Escherichia coli*, *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus dysgalactiae*, *Streptococcus parauberis*, *Streptococcus uberis*, *Staphylococcus* spp., *Trueperella pyogenes* (syn. *Arcanobacterium pyogenes*, *Corynebacterium pyogenes*), *Enterobacter aerogenes*, *Enterobacter cloacae*, *Salmonella* spp.

### 6. DROGI PODANIA

Przed podaniem produktu dokładnie oczyścić i zdezynfekować skórę strzyku, ze szczególnym uwzględnieniem ujścia kanału strzykowego. Zawartość jednej tubostrzykawki należy wprowadzić przez kanał strzykowy do każdej ćwiartki wymienia po ostatnim zdojeniu przed planowanym zasuszeniem, nie później niż 42 dni przed terminem porodu.

### 7. OKRESY KARENCJI

Okres karencji:

Tkanki jadalne: 45 dni;

Mleko: 5 dni od wycielenia lub 8 dni od wycielenia, jeżeli poród nastąpi przed upływem 45 dni.

### 8. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp. {mm/rrrr}

**9. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA**

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

**10. NAPIS „PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ULOTKĘ.”**

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

**11. NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT”**

Wyłącznie dla zwierząt.

**12. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”**

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

**13. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

{logo podmiotu odpowiedzialnego}

**14. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

60/94

**15. NUMER SERII**

Lot {numer}

**INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM****Tubostrzykawka z LDPE****1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO**

Mastisan PN DC, 300 000 j.m./5 g + 150 000 j.m./5 g, zawiesina dowymieniowa

**2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH**

1 tubostrzykawka (5 g) zawiera:

**Substancje czynne:**

Benzylopenicylina prokainowa	300 000 j.m.
Neomycyna (w postaci neomycyny siarczanu)	150 000 j.m.

**3. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT**

Bydło (krowy w okresie zasuszenia)

**4. DROGI PODANIA****Dowymieniowo**

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

**5. OKRESY KARENCJI**

Okres karencji:

Tkanki jadalne: 45 dni;

Mleko: 5 dni od wycielenia lub 8 dni od wycielenia, jeżeli poród nastąpi przed upływem 45 dni.

**6. TERMIN WAŻNOŚCI SERII**

Exp. {mm/rrrr}

**7. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA**

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

**8. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

{logo podmiotu odpowiedzialnego}

**9. NUMER SERII**

Lot {numer}