

**INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH**  
**PUDEŁKO TEKTUROWE**

**1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

**Acatar Acti-Tabs**

60 mg + 2,5 mg, tabletki

*Pseudoephedrini hydrochloridum + Triprolidini hydrochloridum*

**2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH**

**Skład:** 1 tabletki zawiera substancje czynne: pseudoefedryny chlorowodorek 60 mg, triprolidyny chlorowodorek 2,5 mg

**3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH**

oraz substancje pomocnicze m.in. laktozę.

**4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

Tabletki

2 tabletki kod: 5907377139010

4 tabletki kod: 5907377139027

6 tabletek kod: 5909991114916

12 tabletek kod: 5909990422005

**5. SPOSÓB I DROGA PODANIA**

**Sposób stosowania i droga podania:**

Podanie doustne. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

**6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI**

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

**7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE**

Produktu leczniczego nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

**8. TERMIN WAŻNOŚCI**

Termin ważności (EXP):

Nie stosować po upływie terminu ważności.

**9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA**

**Przechowywanie:**

Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

**10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE****11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

**Podmiot odpowiedzialny:**

US Pharmacia Sp. z o.o.

ul. Ziębicka 40, 50-507 Wrocław

(logo podmiotu odpowiedzialnego)

**12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

Pozwolenie nr 11149

**13. NUMER SERII**

Numer serii (Lot):

**14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI**

OTC - Lek wydawany bez recepty.

**15. INSTRUKCJA UŻYCIA**

Lek stosowany w zapaleniu błony śluzowej nosa występującym w przeziębieniu i grypie.

Doraźnie w alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa i naczynioruchowym obrzęku błony śluzowej nosa.

Udrożnia nos

Zmniejsza ilość wydzieliny z nosa

Zmniejsza kichanie

**Dawkowanie:**

Dla dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat. Zalecana dawka: 1 tabletki co 6 do 8 godzin.

Nie należy stosować dawki większej niż 4 tabletki na dobę.

**16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A**

acatar acti-tabs

**17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D**

Nie dotyczy.

**18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA**

Nie dotyczy.