

INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A  
anacard protect 150 mg



Anacard  
PROTECT

Anacard  
150 mg, tabletki dojelitowe  
Acidum acetylsalicylicum  
PROTECT

Anacard  
PROTECT

150  
mg

> zapobieganie zawałowi serca  
u osób dużego ryzyka  
> prewencja wtórna po przebytych zawałach serca



30 tabletek

30  
tabletek



Podmiot odpowiedzialny  
„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI  
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.  
51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Kod

Numer serii (S)  
Termin ważności (Tw)

Podanie doustne.  
Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, 1 tabletkę (150 mg)  
raz na dobę. Tabletki należy połykać w całości, nie  
rozryzać (nie dotyczy stosowania w zawałach serca).  
Świeży zawał serca lub podejrzenie świeżego zawału  
serca: Jednorazowo 2 tabletki (300 mg).  
Tabletki należy bardzo dokładnie rozgryźć  
aby uzyskać szybkie wchłanianie.  
Choroba niedokrwienna serca oraz inne sytuacje  
kliniczne, w tym:  
• zapobieganie zawałowi serca u osób dużego ryzyka  
• przebiegi epizod niestabilnej choroby wieńcowej  
• prewencja wtórna u osób po przebytych zawałach serca  
• u osób z zastożoną miążdżyczą tętnic obwodowych

Sposób i droga podania

Skład

Jedna tabletkę zawiera:  
substancję czynną:  
kwas acetylosalicylowy 150 mg

substancje pomocnicze:  
zółcieni pomarańczowa, lak (E 110) i inne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki  
przed zastosowaniem leku.

Warunki przechowywania

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu,  
w temperaturze poniżej 25°C.

Pozwolenie nr

OTC - Lek wydawany bez recepty.

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym  
i niedostępnym dla dzieci.

INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A  
anacard protect 150 mg

Anacard  
PROTECT

Anacard  
150 mg, tabletki dojelitowe  
Acidum acetylsalicylicum  
PROTECT

Anacard  
PROTECT

150  
mg

> zapobieganie zawałowi serca  
u osób dużego ryzyka  
> prewencja wtórna po przebyłym zawałe serca



60 tabletek

60 tabletek



Podmiot odpowiedzialny  
„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI  
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.  
51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Kod

Numer serii (S)  
Termin ważności (Tw)

Podanie doustne.  
Jeżeli lekarz nie zalecił inaczej, 1 tabletkę (150 mg)  
raz na dobę. Tabletki należy połknąć w całości, nie  
rozryzać (nie dotyczy stosowania w zawałe serca).  
Świeży zawał serca lub podjętrzenie świeżego zawału  
serca: Jednorazowo 2 tabletki (300 mg).  
Tabletki należy bardzo dokładnie rozgryźć  
aby uzyskać szybkie wchłanianie.  
Choroba niedokrwienna serca oraz inne sytuacje  
kliniczne, w tym:  
• zapobieganie zawałowi serca u osób dużego ryzyka  
• przebiegły epizod niestabilnej choroby wieńcowej  
• prewencja wtórna u osób po przebyłym zawałe serca  
• u osób z zarostową miażdżycą tętnic obwodowych

Sposób i droga podania

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym  
i niedostępnym dla dzieci.

OTC - Lek wydawany bez recepty.

Pozwolenie nr

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu,  
w temperaturze poniżej 25°C.

Warunki przechowywania

przed zastosowaniem leku.

Należy zapoznać się z treścią ulotki

złotych pomarańczowa, lak (E 110) i inne.

substancje pomocnicze:

kwasy acetylosalicylowy 150 mg

substancje czynne:

Jedna tabletkę zawiera:

Skład

