

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH**PUDEŁKO TEKSTUROWE na blistry****1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO****Acatar Zatoki**

200 mg + 30 mg, tabletki powlekane

Ibuprofenum + Pseudoephedrini hydrochloridum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Skład: 1 tabletkę powlekana zawiera: ibuprofen 200 mg, pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

oraz substancje pomocnicze m.in. sacharozę, lak żółci pomarańczowej (E 110), lak Allura red AC (E 129) i benzoesanu sodu (E 211).

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Tabletki powlekane

6 tabletek kod : 5909991133924

12 tabletek kod : 5909991133931

24 tabletki kod : 5909991133948

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA**Sposób stosowania i droga podania:**

Podanie doustne. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Produktu leczniczego nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP):

Nie stosować po upływie terminu ważności.

9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA
--

Przechowywanie:

Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE
--

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO
--

Podmiot odpowiedzialny:

US Pharmacia Sp. z o.o.
ul. Ziębicka 40, 50-507 Wrocław
(logo podmiotu odpowiedzialnego)

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 11339

13. NUMER SERII

Numer serii (Lot):

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Lek do doraźnego stosowania w przeziębieniu i grypie.

Udrożnia nos i zatoki
Działa przeciwbólowo
Przeciwgorączkowo
Przeciwzapalnie

Dawkowanie:

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat. W doraźnym leczeniu, zalecana dawka: 1 do 2 tabletek doustnie co 4 godziny po posiłkach. Nie należy stosować dawki większej niż 6 tabletek na dobę.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

acatar zatoki

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D
--

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.