

## INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

### PUDEŁKO TEKTUROWE

#### 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

MicroLax, 4,465 g/5 ml + 0,45 g/5 ml + 0,0645 g/5 ml, roztwór doodbytniczy

#### 2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Sorbitol, ciekły (krystalizujący) ..... 4,4650 g  
Sodu cytrynian ..... 0,4500 g  
Sodu laurylosulfooctan 70% ..... 0,0645 g

w 5 ml roztworu doodbytniczego

#### 3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Substancje pomocnicze: kwas sorbinowy, glicerol i woda oczyszczona.

#### 4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Roztwór doodbytniczy (wlew doodbytniczy) w pojemniku jednodawkowym o pojemności 5 ml.

4 pojemniki                      kod EAN: 3574661429403

6 pojemników                    kod EAN: 5909991363925

12 pojemników                  kod EAN: 5909991363932

50 pojemników                  kod EAN: 5909991363949

#### 5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.  
Do stosowania doodbytniczego.

#### 6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

#### 7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

#### 8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP):

**9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA****10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE****11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB, Box 941, 251 09 Helsingborg, Szwecja

**12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

Nr pozwolenia: 24583

**13. NUMER SERII**

Nr serii (Lot):

**14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI**

OTC – Lek wydawany bez recepty.

**15. INSTRUKCJA UŻYCIA**

Microlax stosuje się w leczeniu okresowych zaparć.

Dorośli: 1 tubka dziennie.

Złamać końcówkę i zwilżyć ją kroplą roztworu z tubki.

Wprowadzić całą końcówkę aplikatora do odbytnicy i nacisnąć tubkę, opróżniając całą jej zawartość.

Wysunąć aplikator, ciągle naciskając tubkę.

Działa w ciągu 5 do 20 minut.

W przypadku pogorszenia bądź utrzymywania się objawów przez więcej niż kilka dni należy skonsultować się z lekarzem. Unikać stosowania leku przez długi czas.

Leczenie zaparć z zastosowaniem leków stanowi jedynie dodatkowy środek względem zdrowego trybu życia:

- zalecane spożywanie dużych ilości płynów i błonnika pokarmowego;
- zalecana aktywność fizyczna i ćwiczenia na pobudzenie pracy jelit.

**16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A**

Microlax

**17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D**

Nie dotyczy.

**18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA**

Nie dotyczy.

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH  
BEZPOŚREDNICH**

**POJEMNIK**

**1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGI PODANIA**

Microlax, 4,465 g/5 ml + 0,45 g/5 ml + 0,0645 g/5 ml, roztwór doodbytniczy

Do stosowania doodbytniczego

**2. SPOSÓB PODAWANIA**

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

**3. TERMIN WAŻNOŚCI**

EXP

**4. NUMER SERII**

Lot

**5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY  
JEDNOSTEK**

5 ml

**6. INNE**