

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

TEKTUROWE PUDEŁKO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Febrisan
(750 mg + 60 mg + 10 mg)/5 g, proszek musujący

Paracetamolum + Acidum ascorbicum + Phenylephrini hydrochloridum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

1 saszетка (5 g proszku musującego) zawiera:

Paracetamol	750 mg
Kwas askorbowy (witamina C)	60 mg
Fenylefryny chlorowodorek	10 mg

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Lek zawiera sacharozę, aspartam, glukozę i sól. Dodatkowe informacje patrz punkt 2 ulotki.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

proszek musujący

8 saszetek	Kod: 5909991084912
12 saszetek	Kod: 5909990864072
16 saszetek	Kod: 5909990864065

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Lek zawiera paracetamol.

Nie stosować z innymi lekami zawierającymi paracetamol, fenylefrynę ani z lekami wykazującymi działanie sympatykomimetyczne. W razie przedawkowania zgłosić się natychmiast do lekarza.

Nie stosować w okresie ciąży lub karmienia piersią ani u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności:

9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w suchym miejscu.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

Orifarm Healthcare A/S
Energivej 15
5260 Odense S
Dania

{logo podmiotu odpowiedzialnego }

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 10849

13. NUMER SERII

Nr serii:

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Lek przeciwko objawom przeziębienia i grypy o działaniu:

- przeciwbólowym
- przeciwgorączkowym
- udroźniającym przewody nosowe

Wskazania

Krótkotrwałe leczenie objawów przeziębienia i grypy, takich jak: gorączka, dreszcze, ból głowy, ból mięśni, ból gardła, katar, ból zatok.

Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:

1 saszetka co 4-6 godzin. Nie stosować więcej niż 4 saszetki na dobę.

Przed zastosowaniem proszek należy rozpuścić w szklance gorącej wody.

smak cytrynowy

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

Febrisan proszek musujący

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH
BEZPOŚREDNICH**

SASZETKA

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA PODANIA

Febrisan
(750 mg + 60 mg + 10 mg)/5 g, proszek musujący

Podanie doustne.

2. SPOSÓB PODAWANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

3. TERMIN WAŻNOŚCI

Nr serii i termin ważności tłoczone na brzegu folii.

4. NUMER SERII

Nr serii i termin ważności tłoczone na brzegu folii.

**5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY
JEDNOSTEK**

1 saszetka (5 g proszku musującego) zawiera:

Paracetamol	750 mg
Kwas askorbowy	60 mg
Fenylefryny chlorowodorek	10 mg

Lek zawiera sacharozę, aspartam, glukozę i sól – patrz punkt 2 ulotki.

6. INNE

Lek przeciwko objawom przeziębienia i grypy o działaniu:

- przeciwbólowym
- przeciwgorączkowym
- udroźniającym przewody nosowe

{logo podmiotu odpowiedzialnego }

Orifarm Healthcare A/S