

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH**PUDEŁKO TEKTUROWE NA 1 BLISTER ZAWIERAJĄCY 10 TABLETEK****1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

IBUM GRIP

200 mg + 30 mg, tabletki powlekane

(*Ibuprofenum + Pseudoephedrini hydrochloridum*)

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)**Skład**

1 tabletkę zawiera:

substancje czynne:

ibuprofen 200 mg

pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, lak żółcieni pomarańczowej i inne.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Tabletki powlekane

10 tabletek

Kod EAN UCC 5909991092412

5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA**Dawkowanie i sposób podawania**

Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia: dawka początkowa 2 tabletki, a następnie w przypadku konieczności od 1 do 2 tabletek co 4 do 6 godzin. Nie przekraczać 6 tabletek na dobę.

Dzieci poniżej 12 roku życia: nie podawać dzieciom poniżej 12 lat.

Osoby w podeszłym wieku: nie jest konieczna modyfikacja dawki, o ile nie jest zaburzona czynność nerek lub wątroby. Jeśli występują zaburzenia czynności nerek lub wątroby, lekarz powinien ustalić dawkowanie indywidualnie.

Jeśli konieczne jest stosowanie leku dłużej niż 3 dni lub pogarsza się stan pacjenta, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C, w celu ochrony przed światłem.

Nie należy stosować leku Ibum Grip po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny

PPF HASCO-LEK S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242E

Logo podmiotu odpowiedzialnego

12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Numer pozwolenia 10924

13. NUMER SERII

Numer serii

14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Wskazania do stosowania

Lek stosuje się doraźnie w celu złagodzenia objawów grypy i przeziębienia, takich jak:

- niedrożność nosa i zatok obocznych nosa
- ból głowy
- gorączka
- bóle stawowo-mięśniowe.

16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM

Ibum Grip

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

PUDEŁKO TEKTUROWE NA 3 BLISTRY ZAWIERAJĄCE PO 10 TABLETEK

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

IBUM GRIP

200 mg + 30 mg, tabletki powlekane

(*Ibuprofenum + Pseudoephedrini hydrochloridum*)

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)

Skład

1 tabletkę zawiera:

substancje czynne:

ibuprofen 200 mg

pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, lak żółcieni pomarańczowej i inne.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Tabletki powlekane

30 tabletek

Kod EAN UCC 5909991092436

5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA

Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia: dawka początkowa 2 tabletki, a następnie w przypadku konieczności od 1 do 2 tabletek co 4 do 6 godzin. Nie przekraczać 6 tabletek na dobę.

Dzieci poniżej 12 roku życia: nie podawać dzieciom poniżej 12 lat.

Osoby w podeszłym wieku: nie jest konieczna modyfikacja dawki, o ile nie jest zaburzona czynność nerek lub wątroby. Jeśli występują zaburzenia czynności nerek lub wątroby, lekarz powinien ustalić dawkowanie indywidualnie.

Jeśli konieczne jest stosowanie leku dłużej niż 3 dni lub pogarsza się stan pacjenta, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C, w celu ochrony przed światłem.

Nie należy stosować leku Ibum Grip po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO****Podmiot odpowiedzialny**

PPF HASCO-LEK S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242E

Logo podmiotu odpowiedzialnego

12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Numer pozwolenia 10924

13. NUMER SERII

Numer serii

14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA**Wskazania do stosowania**

Lek stosuje się doraźnie w celu złagodzenia objawów grypy i przeziębienia, takich jak:

- niedrożność nosa i zatok obocznych nosa
- ból głowy
- gorączka
- bóle stawowo-mięśniowe.

16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM

Ibum Grip

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

PUDEŁKO TEKTUROWE NA 2 BLISTRY ZAWIERAJĄCE PO 10 TABLETEK

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

IBUM GRIP

200 mg + 30 mg, tabletki powlekane

(*Ibuprofenum + Pseudoephedrini hydrochloridum*)

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)

Skład

1 tabletkę zawiera:

substancje czynne:

ibuprofen 200 mg

pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, lak żółcieni pomarańczowej i inne.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Tabletki powlekane

20 tabletek

Kod EAN UCC 5909991092429

5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA

Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia: dawka początkowa 2 tabletki, a następnie w przypadku konieczności od 1 do 2 tabletek co 4 do 6 godzin. Nie przekraczać 6 tabletek na dobę.

Dzieci poniżej 12 roku życia: nie podawać dzieciom poniżej 12 lat.

Osoby w podeszłym wieku: nie jest konieczna modyfikacja dawki, o ile nie jest zaburzona czynność nerek lub wątroby. Jeśli występują zaburzenia czynności nerek lub wątroby, lekarz powinien ustalić dawkowanie indywidualnie.

Jeśli konieczne jest stosowanie leku dłużej niż 3 dni lub pogarsza się stan pacjenta, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C, w celu ochrony przed światłem.

Nie należy stosować leku Ibum Grip po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO****Podmiot odpowiedzialny**

PPF HASCO-LEK S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242E

Logo podmiotu odpowiedzialnego

12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Numer pozwolenia 10924

13. NUMER SERII

Numer serii

14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA**Wskazania do stosowania**

Lek stosuje się doraźnie w celu złagodzenia objawów grypy i przeziębienia, takich jak:

- niedrożność nosa i zatok obocznych nosa
- ból głowy
- gorączka
- bóle stawowo-mięśniowe.

16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM

Ibum Grip

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.