

## INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

### TEKTUROWE PUDEŁKO

#### 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Muccosinal, 600 mg, tabletki musujące  
*Acetylcysteinum*  
Dla dorosłych i młodzieży powyżej 14 lat.

#### 2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Każda tabletkę musująca zawiera 600 mg acetylocysteiny.

#### 3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Zawiera laktozę, sól i sorbitol. Dalsze informacje patrz ulotka.

#### 4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Tabletka musująca

Pojemnik polipropylenowy:

10 tabletek musujących                      Kod: 5909991324636

Blister miękki:

10 tabletek musujących                      Kod: 5909991324643

#### 5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doustne.  
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

#### 6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

#### 7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

#### 8. TERMIN WAŻNOŚCI

Pojemnik polipropylenowy: Po pierwszym otwarciu okres ważności wynosi: 1 rok.

EXP

EXP = Termin ważności

#### 9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Pojemnik polipropylenowy:

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w celu ochrony przed wilgocią.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

**10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**

**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

Podmiot odpowiedzialny:  
Dr. Max Pharma s.r.o.  
Na Florenci 2116/15  
Nové Město  
110 00 Praga 1  
Republika Czeska  
[logo podmiotu odpowiedzialnego]

**12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

Numer pozwolenia: 23886

**13. NUMER SERII**

Lot  
Lot = Numer serii

**14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI**

OTC - Lek wydawany bez recepty.

**15. INSTRUKCJA UŻYCIA**

Muccosinal stosowany jest w leczeniu ostrych stanów w przebiegu chorób układu oddechowego – w przeziębieniu przebiegającym z wydzielaniem lepkiego śluzu i utrudnionym odkrztuszaniem u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat.

**Dawkowanie:**

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 14 lat: 1 tabletkę musującą na dobę. U młodzieży należy stosować pół tabletki dwa razy na dobę.

Tabletkę należy rozpuścić w połowie szklanki wody. Roztwór należy wypić bezpośrednio po rozpuszczeniu tabletki, nie później niż 2 godziny po przygotowaniu.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

**16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A**

muccosinal

**17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D**

Nie dotyczy.

**18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA**

Nie dotyczy.

**INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH**

**POJEMNIK POLIPROPYLENOWY**

**1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

Muccosinal, 600 mg, tabletki musujące  
*Acetylcysteinum*  
Dla dorosłych i młodzieży powyżej 14 lat.

**2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ**

Każda tabletkę musująca zawiera 600 mg acetylocysteiny.

**3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH**

Zawiera laktozę, sól i sorbitol. Dalsze informacje patrz ulotka.

**4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

Tabletka musująca

10 tabletek musujących

**5. SPOSÓB I DROGA PODANIA**

Podanie doustne.  
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

**6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI**

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

**7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE**

**8. TERMIN WAŻNOŚCI**

Po pierwszym otwarciu: 1 rok.  
EXP

**9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA**

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w celu ochrony przed wilgocią.  
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

**10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**

**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

Dr. Max Pharma s.r.o.  
Na Florenci 2116/15  
Nové Město  
110 00 Praga 1  
Republika Czeska

**12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

Numer pozwolenia: 23886

**13. NUMER SERII**

Lot

**14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI**

OTC - Lek wydawany bez recepty.

**15. INSTRUKCJA UŻYCIA**

Muccosinal stosowany jest w leczeniu ostrych stanów w przebiegu chorób układu oddechowego – w przeziębieniu przebiegającym z wydzielaniem lepkiego śluzu i utrudnionym odkrztuszaniem u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat.

**Dawkowanie:**

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 14 lat: 1 tabletkę musującą na dobę. U młodzieży należy stosować pół tabletki dwa razy na dobę.

Tabletkę należy rozpuścić w połowie szklanki wody. Roztwór należy wypić bezpośrednio po rozpuszczeniu tabletki, nie później niż 2 godziny po przygotowaniu.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

**16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A**

**17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D**

Nie dotyczy.

**18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA**

Nie dotyczy.

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH**

**BLISTER MIĘKKI**

**1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

Muccosinal, 600 mg, tabletki musujące  
*Acetylcysteinum*

**2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

Dr. Max Pharma s.r.o.  
[logo podmiotu odpowiedzialnego]

**3. TERMIN WAŻNOŚCI**

EXP

**4. NUMER SERII**

Lot

**5. INNE**