

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH**ETYKIETA****1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

**Multi-Sanostol
Syrup**

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)**Skład**

10 ml syropu zawiera substancje czynne:

Witamina A - 2400 j.m., Witamina D₃ - 200 j.m., Witamina B₁ - 2 mg, Witamina B₂ - 2 mg, Witamina B₆ - 1 mg, Witamina C - 100 mg, Witamina E - 2 mg, Witamina PP - 10 mg, Dekspantenol - 4 mg, Wapnia glukonian - 50 mg, Wapnia fosforomleczan - 50 mg

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

oraz substancje pomocnicze, w tym sacharozę, syrop glukozowy, sodu benzoesan, kwas sorbowy.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

300 g
600 g

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Podanie doustne.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE**8. TERMIN WAŻNOŚCI**

Termin ważności:

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Orifarm Healthcare A/S

{logo podmiotu odpowiedzialnego} - Orifarm Healthcare

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

13. NUMER SERII

Nr serii:

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Wielowitaminowy preparat dla dzieci.
Zapobiega niedoborom witamin.
W okresie wzrostu i rozwoju

Dawkowanie

Przed użyciem butelkę należy wstrząsnąć.

Dzieci w wieku 1 do 6 lat: 2 razy na dobę po 5 ml syropu.

Dzieci w wieku od 6 lat, młodzież i dorośli: 2 razy na dobę po 10 ml syropu.

Nie przekraczać zalecanego dawkowania.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

TEKTUROWE PUDEŁKO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Multi-Sanostol
syrop

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Skład

10 ml syropu zawiera substancje czynne:

Witamina A	- retynolu palmitynian	2400 j.m.
Witamina D ₃	- cholekalcyferol	200 j.m.
Witamina B ₁	- tiaminy chlorowodorek	2 mg
Witamina B ₂	- ryboflawiny sodu fosforan	2 mg
Witamina B ₆	- pirydoksyny chlorowodorek	1 mg
Witamina C	- kwas askorbowy	100 mg
Witamina E	- all-rac- α -tokoferylu octan	2 mg
Witamina PP	- nikotynamid	10 mg
Dekspantenol		4 mg
Wapnia glukonian		50 mg
Wapnia fosforomleczan		50 mg

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

oraz substancje pomocnicze, w tym cukry, sodu benzoesan (E 211) i kwas sorbowy (E 200).

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

syrop

300 g Kod: 5909990035212

600 g Kod: 5909990035229

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Podanie doustne.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności

Po otwarciu butelki, leku nie przechowywać dłużej niż 3 miesiące.

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny

Orifarm Healthcare A/S
Energivej 15
5260 Odense S
Dania

{logo podmiotu odpowiedzialnego} - Orifarm Healthcare

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/0352

13. NUMER SERII

Nr serii

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Wielowitaminowy preparat dla dzieci.
Zapobiega niedoborom witamin.
W okresie wzrostu i rozwoju

Wskazania do stosowania

Zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych w stanach zwiększonego zapotrzebowania na witaminy, utrata apetytu, skłonność do częstych infekcji, okres wzrostu i rozwoju, stany wyczerpania fizycznego i psychicznego, przemęczenie, obniżona zdolność koncentracji, okres rekonwalescencji po przebytych chorobach oraz antybiotykoterapii, w celu poprawy ogólnej kondycji organizmu.

Multi-Sanostol może być podawany dzieciom powyżej 1. roku życia, a także młodzieży i dorosłym.

Dawkowanie

Przed użyciem butelkę należy wstrząsnąć.

Dzieci w wieku od 1 do 6 lat: 2 razy na dobę po 5 ml syropu.

Dzieci w wieku od 6 lat, młodzież i dorośli: 2 razy na dobę po 10 ml syropu.

Nie przekraczać zalecanego dawkowania.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Multi-Sanostol syrop 300 g

Multi-Sanostol syrop 600 g

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.