

## INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

Pudełko tekturowe zawierające blister(y)

### 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

**Naxii**

*Naproxenum natricum*

220 mg,

tabletki powlekane

### 2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

**Skład**

1 tabletkę powlekaną zawiera:

*substancję czynną*: naproksen sodowy 220 mg

### 3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

oraz *substancje pomocnicze* m.in. laktozę jednowodną.

### 4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

2 tabletki powlekane                      kod EAN 5909990616022

10 tabletek powlekanych                kod EAN 5909990910113

20 tabletek powlekanych                kod EAN 5909990910120

30 tabletek powlekanych                kod EAN 5907377139119

### 5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

### 6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

### 7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

### 8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP):

### 9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

**Przechowywanie**

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

### 10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO****Podmiot odpowiedzialny**

US Pharmacia Sp. z o.o.  
ul. Ziębicka 40,  
50-507 Wrocław

{logotyp podmiotu odpowiedzialnego}

**12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

Pozwolenie nr 9101

**13. NUMER SERII**

Numer serii (Lot):

**14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI**

OTC - Lek wydawany bez recepty.

**15. INSTRUKCJA UŻYCIA****Wskazania**

LEK PRZECIWBÓLOWY, PRZECIWZAPALNY I PRZECIWGORĄCZKOWY

bóle reumatyczne

bóle pleców

bóle mięśni

bóle głowy

bóle menstruacyjne

bóle związane z przeziębieniem

bóle zębów

gorączka

**Dawkowanie i droga podania****Dorośli i dzieci w wieku powyżej 16 lat:**

jednorazowo 1 tabletkę co 8 do 12 godzin do ustąpienia objawów.

U niektórych osób zastosowanie dawki początkowej 2 tabletki (440 mg), a następnie 1 tabletki (220 mg) po upływie 12 godzin może spowodować zwiększenie działania przeciwbólowego.

maksymalna dawka dobową: 3 tabletki (660 mg).

**16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A**

naxii

**17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D**

Nie dotyczy.

**18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA**

Nie dotyczy.