

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

Pudełko tekturowe

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Nemast DC, 500 000 j.m./5 g + 150 000 j.m./5 g, zawiesina dowymieniowa

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

1 tubostrzykawka (5 g) zawiera:

Substancje czynne:

Erytromycyny stearynian 500 000 j.m.

Neomycyny siarczan 150 000 j.m.

3. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

1 x 20 tubostrzykawk

4. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło (krowy w okresie zasuszenia)

5. WSKAZANIA LECZNICZE

Wskazania: Leczenie i zapobieganie zapaleniom gruczołu mlekowego w okresie zasuszenia wywołanym infekcją: *Escherichia coli*, *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus dysgalactiae*, *Streptococcus parauberis*, *Streptococcus uberis*, *Staphylococcus spp.*, *Trueperella pyogenes* (*Arcanobacterium pyogenes*, *Corynebacterium pyogenes*), *Enterobacter aerogenes*, *Enterobacter cloacae*, *Salmonella spp.*, *Neisseria spp.*, *Haemophilus spp.*, *Pasteurella multocida*, *Listeria spp.*, *Mycoplasma spp.*

6. DROGI PODANIA

Przed podaniem produktu dokładnie oczyścić i zdezynfekować skórę strzyku, ze szczególnym uwzględnieniem ujścia kanału strzykowego. Zawartość jednej tubostrzykawki należy wprowadzić przez kanał strzykowy do każdej ćwiartki wymienia po ostatnim zdojeniu przed planowanym zasuszeniem, nie później niż 42 dni przed terminem porodu.

7. OKRESY KARENCJI

Okres karencji:

Tkanki jadalne – 42 dni

Mleko – 5 dni od wycielenia, w przypadku podania produktu na 42 lub więcej dni przed porodem, 6 dni od wycielenia, jeżeli poród nastąpił przed upływem 42 dni od podania produktu.

8. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp. {mm/rrrr}

9. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

10. NAPIS „PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ULOTKĘ.”

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

11. NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT”

Wyłącznie dla zwierząt.

12. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

13. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

{logo podmiotu odpowiedzialnego}

14. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

1194/01

15. NUMER SERII

Lot {numer}

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM

Tubostrzykawka z LDPE

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Nemast DC, 500 000 j.m./5 g + 150 000 j.m./5 g, zawiesina dowymieniowa

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

1 tubostrzykawka (5 g) zawiera:

Substancje czynne:

Erytromycyny stearynian	500 000 j.m.
Neomycyny siarczan	150 000 j.m.

3. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło (krowy w okresie zasuszenia)

4. DROGI PODANIA

Dowymieniowo

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

5. OKRESY KARENCJI

Okres karencji:

Tkanki jadalne – 42 dni

Mleko – 5 dni od wycielenia, w przypadku podania produktu na 42 lub więcej dni przed porodem, 6 dni od wycielenia, jeżeli poród nastąpił przed upływem 42 dni od podania produktu.

6. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp. {mm/rrrr}

7. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

8. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

{logo podmiotu odpowiedzialnego}

9. NUMER SERII

Lot {numer}