

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

PUDEŁKO TEKTUROWE

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Neo-angin Spray

(14,58 mg + 2,92 mg + 0,87 mg)/ml, roztwór do stosowania na błonę śluzową jamy ustnej i gardła

Alcohol 2,4-dichlorobenzylicus + Amylmetacresolum + Levomentholum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Skład:

Jeden ml roztworu zawiera substancje czynne:

- alkohol 2,4-dichlorobenzylowy - 14,58 mg
- amylometakrezol - 2,92 mg
- lewomentol - 0,87 mg

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

oraz substancje pomocnicze: olejek z anyżu gwiazdzistego, olejek miętowy, etanol, glikol propylenowy.

Dalsze informacje - patrz ulotka.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Opakowanie zawiera 15 ml roztworu.

Kod : 5909990248117

Opakowanie zawiera 30 ml roztworu.

Kod : 5909990569489

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Sposób stosowania i droga podania:

Podanie na śluzówkę jamy ustnej i gardła.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat:

Należy stosować jedną dawkę leku do 6 razy na dobę.

W celu podania dawki leku należy zdjąć nasadkę ochronną, wstrzymać oddech i nacisnąć dwukrotnie głowicę pojemnika, wprowadzając roztwór do jamy ustnej.

Nie należy stosować częściej niż 6 razy na dobę.

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności:

9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA
--

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE
--

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO
--

Podmiot odpowiedzialny:

M.C.M. Klosterfrau Healthcare Sp. z o.o.
ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Nr pozwolenia: R/2481

13. NUMER SERII

Numer serii:

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Neo-angin spray jest zalecany do wspomagania leczenia stanów zapalnych jamy ustnej i gardła, przebiegających z objawami, takimi jak: ból gardła, zaczerwienienie, obrzęk.

Neo-angin spray to lek w postaci roztworu do stosowania na błonę śluzową jamy ustnej i gardła. Zawiera dwie substancje (alkohol 2,4-dichlorobenzylowy i amylometakrezol) o działaniu przeciwbakteryjnym i przeciwgrzybiczym oraz lewomentol, który wywołuje na błonach śluzowych uczucie chłodu i ma słabe działanie znieczulające miejscowo.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Neo-angin spray

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D
--

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH
BEZPOŚREDNICH**

ETYKIETA BUTELKI

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA PODANIA

Neo-angin Spray
(14,58 mg + 2,92 mg + 0,87 mg)/ml, roztwór do stosowania na błonę śluzową jamy ustnej i gardła
Alcohol 2,4-dichlorobenzylicus + Amylmetacresolum + Levomentholum

2. SPOSÓB PODAWANIA

Sposób stosowania i droga podania:
Stosować według załączonej ulotki.

3. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności:

4. NUMER SERII

Numer serii:

**5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY
JEDNOSTEK**

Opakowanie zawiera 15 ml roztworu.
Opakowanie zawiera 30 ml roztworu.

6. INNE

Skład:

Jeden ml roztworu zawiera substancje czynne:

- alkohol 2,4-dichlorobenzylowy - 14,58 mg
- amylometakrezol - 2,92 mg
- lewomentol - 0,87 mg

oraz substancje pomocnicze: olejek z anyżu gwiazdzistego, olejek miętowy, etanol, glikol propylenowy.

Podmiot odpowiedzialny:

M.C.M. Klosterfrau Healthcare Sp. z o.o.

Nr pozwolenia: R/2481