

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

pudełko tekturowe (blistry miękkie)

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

APAP ból i gorączka C plus

Paracetamolum + Acidum ascorbicum

500 mg + 300 mg,
tabletki musujące

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)

Skład

1 tabletkę musującą zawiera: *substancje czynne:*

paracetamol 500 mg

kwask askorbowy (witamina C) 300 mg

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

oraz *substancje pomocnicze*, w tym aspartam (E951), lek zawiera sól - patrz ulotka.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

tabletkę musującą

2 tabletki musujące kod EAN 5909991004965

6 tabletek musujących kod EAN 5909991004910

10 tabletek musujących kod EAN 5909991004927

20 tabletek musujących kod EAN 5909991004941

5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA

Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Ostrzeżenia

Lek zawiera paracetamol. Ze względu na ryzyko uszkodzenia wątroby w czasie stosowania leku nie należy:

- przyjmować innych leków zawierających paracetamol
- pić alkoholu

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności:

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA**Przechowywanie**

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO****Podmiot odpowiedzialny**

US Pharmacia Sp. z o.o.

ul. Ziębicka 40

50-507 Wrocław

{logotyp podmiotu}

12. NUMER(Y) POZWOLENIA(N) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 10049

13. NUMER SERII

Numer serii:

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC – Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA**Wskazania**

Działa przeciwgorączkowo i przeciwbólowo

Gorączka
Ból
Uzupełnia niedobór witaminy C w infekcjach wirusowych

smak cytrynowy

Dawkowanie i droga podania

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:

pojedyncza dawka: 1 tabletkę, przyjmować co 4-6 godzin
maksymalna dawka dobową: 3 tabletki

Przed zażyciem tabletkę należy rozpuścić w ½ szklanki wody.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

apap ból i gorączka c plus

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

blister miękki

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

APAP ból i gorączka C plus

Paracetamolum + Acidum ascorbicum

500 mg + 300 mg,

tabletki musujące

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

US Pharmacia Sp. z o.o.

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP

4. NUMER SERII

Lot

5. INNE

1 tabletki musująca

smak cytrynowy