

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

PUDEŁKO TEKTUROWE

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

APAP przeziębienie,
(650 mg + 50 mg + 10 mg)/ saszetkę,
proszek do sporządzania roztworu doustnego
Paracetamolum + Acidum ascorbicum + Phenylephrini hydrochloridum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Skład

1 saszetka zawiera: *substancje czynne:*
paracetamol 650 mg
kwas askorbowy 50 mg
fenylefryny chlorowodorek 10 mg

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

oraz *substancje pomocnicze*, w tym: aspartam (E 951), sacharoza, sól i inne.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

proszek do sporządzania roztworu doustnego

5 saszetek	kod 5909991115418
8 saszetek	kod 5909991115425
10 saszetek	kod 5909991115432
12 saszetek	kod 5907377139164

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doustne.
Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią ulotki.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Ostrzeżenia

Lek zawiera paracetamol.

Ze względu na ryzyko uszkodzenia wątroby w czasie stosowania leku nie należy:

- przyjmować innych leków zawierających paracetamol,
- pić alkoholu.

Lek zawiera: 20 mg aspartamu, 1,981 g sacharozy oraz 78,13 mg sodu - dodatkowe informacje patrz ulotka.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności:

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny

US Pharmacia Sp. z o.o.
ul. Ziębicka 40,
50-507 Wrocław
{tel.} 22 543 60 00
{logo podmiotu odpowiedzialnego}

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 11154

13. NUMER SERII

Numer serii:

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC – Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Wskazania

Krótkotrwałe łagodzenie objawów przeziębienia, grypy i zakażeń grypopodobnych, takich jak:

Gorączka

Bóle: głowy, gardła, mięśni, kostno-stawowe

Katar

Niedrożność nosa

Smak cytrynowy

Dawkowanie i droga podania

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:

- 1 saszetka co 4-6 godzin

- maksymalna dawka dobową: 6 saszetek.

Zawartość saszetki należy rozpuścić w szklance gorącej wody.

Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

apap przeziębienie

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.