

OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

PUDEŁKO TEKTUROWE

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

NiQuitin
(*Nicotinum*)

Pastylki do ssania 2 mg

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Skład: 1 pastylka do ssania zawiera jako substancję czynną 2 mg nikotyny oraz substancje pomocnicze.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Produkt zawiera aspartam (E951), mannitol (E421).

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Pastylki do ssania
Smak miętowy

12 pastylek	kod: 5909990949038
24 pastylki	kod: 5909990049226
36 pastylek	kod: 5909990949014
72 pastylki	kod: 5909990949021

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, należy skonsultować się z lekarzem.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP):

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Logo

Podmiot odpowiedzialny:

Perrigo Poland Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 9490

13. NUMER SERII

Numer serii (LOT):

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Produkt pomagający rzucić palenie

NiQuitin 2 mg - jest odpowiedni dla palaczy wypalających 20 lub mniej papierosów dziennie

Lek NiQuitin jest wskazany do łagodzenia objawów wynikających z odstawienia nikotyny, w tym uczucia głodu nikotynowego, związanych z rzucaniem palenia tytoniu.

Nie stosować więcej niż 15 pastylek w ciągu doby. NiQuitin jest wskazany do stosowania u dorosłych od 18 lat.

16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM

NIQUITIN 2 mg

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

PUDEŁKO TEKTUROWE

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

NiQuitin
(*Nicotinum*)

Pastyłki do ssania 4 mg

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Skład: 1 pastylka do ssania zawiera jako substancję czynną 4 mg nikotyny oraz substancje pomocnicze.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Produkt zawiera aspartam (E951), mannitol (E421).

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Pastyłki do ssania

Smak miętowy

12 pastylek kod: 5909990949137

24 pastylki kod: 5909990049233

36 pastylek kod: 5909990949113

72 pastylki kod: 5909990949120

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, należy skonsultować się z lekarzem.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP):

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Logo

Podmiot odpowiedzialny:

Perrigo Poland Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 9491

13. NUMER SERII

Numer serii (LOT):

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Produkt pomagający rzucić palenie

NiQuitin 4 mg - jest odpowiedni dla palaczy wypalających więcej niż 20 papierosów dziennie

Lek NiQuitin jest wskazany do łagodzenia objawów wynikających z odstawienia nikotyny, w tym uczucia głodu nikotynowego, związanych z rzucaniem palenia tytoniu.

Nie stosować więcej niż 15 pastylek w ciągu doby. W przypadku terapii łączonej maksymalna dawka dobową wynosi 10 pastylek. NiQuitin jest wskazany do stosowania u dorosłych od 18 lat.

16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM

NIQUITIN 4 mg

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

BLISTER

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

NiQuitin
(*Nicotinum*)

Pastyłki do ssania 2 mg
Smak miętowy

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Perrigo Poland Sp. z o.o.

3. TERMIN WAŻNOŚCI

{skrót EXP zostanie wytłoczony na blistrze obok ciągu cyfr oznaczających termin ważności}

4. NUMER SERII

{skrót Lot zostanie wytłoczony na blistrze obok ciągu znaków oznaczających numer serii}

5. INNE

Produkt NiQuitin w dawce 2 mg jest odpowiedni dla palaczy wypalających 20 lub mniej papierosów dziennie.

Jedną pastylkę umieścić w jamie ustnej i od czasu do czasu przemieszczać ją z jednej strony jamy ustnej na drugą aż do całkowitego rozpuszczenia (około 20-30 min).

Nie stosować więcej niż 15 pastylek w ciągu doby.

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

BLISTER

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

NiQuitin
(*Nicotinum*)

Pastyłki do ssania 4 mg
Smak miętowy

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Perrigo Poland Sp. z o.o.

3. TERMIN WAŻNOŚCI

{skrót EXP zostanie wytłoczony na blistrze obok ciągu cyfr oznaczających termin ważności}

4. NUMER SERII

{skrót Lot zostanie wytłoczony na blistrze obok ciągu znaków oznaczających numer serii}

5. INNE

Produkt NiQuitin w dawce 4 mg jest odpowiedni dla palaczy wypalających więcej niż 20 papierosów dziennie.

Jedną pastylkę umieścić w jamie ustnej i od czasu do czasu przemieszczać ją z jednej strony jamy ustnej na drugą aż do całkowitego rozpuszczenia (około 20-30 min).

Nie stosować więcej niż 15 pastylek w ciągu doby. W przypadku terapii łączonej maksymalna dawka dobową wynosi 10 pastylek.