

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH  
BEZPOŚREDNICH**

butelka ze szkła oranżowego z zakrętką z aluminium.

Logo

**1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

Apitussic  
52 mg/5 ml  
Syrup

*Sulfogaiacolum*

**2. SPOSÓB PODAWANIA**

Podanie doustne

**3. TERMIN WAŻNOŚCI**

Termin ważności:

**4. NUMER SERII**

Nr serii:

**5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY  
JEDNOSTEK**

120 ml

**6. INNE**

Pozwolenia nr R/0499  
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.  
Po pierwszym otwarciu zużyć w ciągu 30 dni.

## INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

Logo

### 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Apitussic  
52 mg/5 ml  
Syrup

*Sulfogaiacolum*

### 2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

5 ml syropu zawiera 52 mg sulfogwajakolu.

### 3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Substancje pomocnicze: ziołomiód sosnowy (zawiera sacharozę) i inne.

### 4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Syrup  
120 ml

### 5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doustne.  
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

### 6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

### 7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

### 8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności:

### 9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

**10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**

**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

Farmina sp. z o.o.  
ul. Lipska 44  
30-721 Kraków

**12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

Pozwolenie nr R/0499

**13. NUMER SERII**

Nr serii:

**14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI**

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC.

**15. INSTRUKCJA UŻYCIA**

Dzieci w wieku powyżej 6 lat: 3 lub 4 razy dziennie 5 ml (1 łyżeczka od herbaty)

Dzieci starsze i młodzież: 3 lub 4 razy dziennie 10 ml (2 łyżeczki od herbaty)

Dorośli: 3 lub 4 razy dziennie 10 ml (1 łyżka stołowa)

**16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A**

Apitussic