

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

Tekturowe pudełko

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Nurofen, 200 mg, tabletki powlekane

Ibuprofenum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

1 tabletka zawiera substancję czynną ibuprofen 200 mg.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Zawiera również sacharozę.

Wykaz substancji pomocniczych – patrz ulotka dla pacjenta.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Tabletki powlekane.

2 tabletki powlekane	Numer GTIN	5909990668731
4 tabletki powlekane	Numer GTIN	5909990706815
8 tabletek powlekanych	Numer GTIN	5909990706853
10 tabletek powlekanych	Numer GTIN	5909990973248
12 tabletek powlekanych	Numer GTIN	5909990706822
12 tabletek powlekanych		
w opakowaniu plastikowym	Numer GTIN	5909990706846
24 tabletki powlekane	Numer GTIN	5909990214976
36 tabletek powlekanych	Numer GTIN	5909990214983
48 tabletek powlekanych	Numer GTIN	5909990706860

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Lek przeciwbólowy i przeciwzapalny. Nie stosować u pacjentów o masie ciała poniżej 20 kg.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP):

9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

Podmiot odpowiedzialny:
Reckitt Benckiser (Poland) S.A.
ul. Okunin 1
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: R/7068

13. NUMER SERII

Nr serii (Lot):

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC – Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA**Wskazania do stosowania:**

Bóle różnego pochodzenia (bóle głowy, bóle zębów np. po ekstrakcji, nerwobóle, bóle mięśniowe, stawowe i kostne, bóle towarzyszące grypie i przeziębieniu). Gorączka. Bolesne miesiączkowanie.

Dawkowanie i sposób stosowania:

Dzieci od 6 do 9 lat (20 do 30 kg):. w razie potrzeby, 1 tabletką 200 mg co 6 godzin.

Nie należy przekraczać dawki 3 tabletki/dobę (600 mg).

Dzieci od 9 do 12 lat (30 do 40 kg): w razie potrzeby, 1 tabletka 200 mg co 4 do 6 godzin. Nie należy przekraczać dawki 4 tabletki/dobę (800 mg).

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat (powyżej 40 kg): Dawka początkowa – dwie tabletki, następnie w razie potrzeby od 1 do 2 tabletek co 4 do 6 godzin. Tabletki należy popić wodą. Nie stosować więcej niż 6 tabletek (1200 mg ibuprofenu) w ciągu doby. Należy zachować czterogodzinną przerwę między dawkami.

U osób z dolegliwościami przewodu pokarmowego zaleca się przyjmowanie leku podczas posiłku. Jeśli pomimo przyjmowania leku dolegliwości bólowe nie ustąpią, nasilą się lub wystąpią nowe, dodatkowe objawy, należy skontaktować się z lekarzem.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Nurofen tabletki powlekane

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR — KOD 2D
--

Nie dotyczy

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR — DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

Blister

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Nurofen, 200 mg, tabletki powlekane

Ibuprofenum

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP

4. NUMER SERII

LOT

5. INNE