

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH**PUDEŁKO TEKTUROWE****1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO****Gripblocker Zatoki****250 mg + 30 mg, kapsułki miękkie***Paracetamolum + Pseudoephedrini hydrochloridum***2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH****Skład**

1 kapsułka miękka zawiera:

Substancje czynne

Paracetamol 250 mg

Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH*Substancje pomocnicze*

Sorbitol ciekły niekryształizujący, czerwien koszenilowa E124, żółcień chinolinowa E104 i inne.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

12 kapsułek miękkich

Kod EAN: 5909991160418

24 kapsułki miękkie

Kod EAN: 5909991160425

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Sposób i droga podania

Podanie doustne.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE**8. TERMIN WAŻNOŚCI****Termin ważności (Tw)**

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA**Warunki przechowywania**

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO****Podmiot odpowiedzialny**

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Logo podmiotu odpowiedzialnego

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 11604

13. NUMER SERII

Numer serii (S)

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

- Zapalenie zatok przynosowych
- Zatkany nos
- Gorączka
- Ból głowy

Wskazania

Lek Gripblocker Zatoki stosuje się w leczeniu objawów grypy i zakażeń grypopodobnych, przebiegających z gorączką oraz bólami głowy, bólami mięśniowymi i kostno-stawowymi, jak również w leczeniu objawów zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych.

Dawkowanie

- *Dorośli i młodzież powyżej 12 lat*
2 kapsułki co 4-6 godzin, maksymalnie 8 kapsułek na dobę
- *Dzieci w wieku 6-12 lat*
1 kapsułka co 6 godzin, maksymalnie 4 kapsułki na dobę

U dzieci w wieku poniżej 12 lat leku nie należy stosować bez zalecenia lekarza.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

gripblocker zatoki