

Butelka ze szkła barwnego z zakrętką polietylenową a 30g – tekst proponowany

Olej rycynowy

Oleum Ricini FP

Skład: 100g zawiera 100g Oleum Ricini

Zawartość: 30g

Działanie: silnie drażniące ściany jelit, nasilające ruchy perystaltyczne jelita cienkiego

Wskazania do stosowania: doraźnie w zaparciu. Nie stosować przez czas dłuższy (kilka dni)

Przeciwwskazania: niedrożność jelit, zapalenie wyrostka robaczkowego, stany zapalne w obrębie jamy brzusznej i miednicy mniejszej u kobiet (macica, jajniki, jajowody), owrzodzenie jelit, krwawienia wewnętrzne, bóle brzucha o nieustalonej przyczynie, niewyjaśnione dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Nie stosować u dzieci do 12 roku życia, u dzieci starszych tylko w porozumieniu z lekarzem.

Interakcje: lek wzmacnia działanie olejków lotnych. Ostre przyprawy nasilają jego drażniące działanie.

Działania niepożądane: nawet w dawkach leczniczych drażni jelito cienkie, następuje przekrwienie narządów jamy brzusznej i miednicy mniejszej, co może być przyczyną zaostrzenia istniejących stanów zapalnych. Dłuższe stosowanie powoduje dolegliwości żołądkowo-jelitowe, brak apetytu i utratę elektrolitów (potas).

Ciąża i okres karmienia piersią: nie należy stosować w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Wpływ na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn w ruchu: nie wywiera wpływu.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem: lek może być stosowany sporadycznie. Systematyczne stosowanie powoduje silne podrażnienie przewodu pokarmowego. Jeżeli zaparcie utrzymuje się mimo jednorazowego przyjęcia leku lub pojawią się inne dolegliwości należy skontaktować się z lekarzem.

Sposób stosowania i droga podania: doustnie, dorośli 5 -10g (½ -1 łyżka) jednorazowo. Przeczyszczenie następuje po 2-6 godzinach.

Przechowywanie: przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Warunki przechowywania: w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 25°C. Nie stosować po upływie terminu ważności.

Wydaje się bez recepty

Nr serii:

Termin ważności : (miesiąc, rok)

Nr pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:

Kod EAN UCC: 590 999 001 176 6

Podmiot odpowiedzialny: PPH MICROFARM
Kacperski i wspólnicy Spółka jawna
os. H. Sienkiewicza 33
32-080 Zabierzów
tel./fax 12 656 62 35

Data zatwierdzenia tekstu:

Butelka ze szkła barwnego z zakrętką aluminiową a 100g – tekst proponowany

Olej rycynowy

Oleum Ricini FP

Skład: 100g zawiera 100g Oleum Ricini

Zawartość: 100g

Działanie: silnie drażniące ściany jelit, nasilające ruchy perystaltyczne jelita cienkiego

Wskazania do stosowania: doraźnie w zaparciu. Nie stosować przez czas dłuższy (kilka dni)

Przeciwwskazania: niedrożność jelit, zapalenie wyrostka robaczkowego, stany zapalne w obrębie jamy brzusznej i miednicy mniejszej u kobiet (macica, jajniki, jajowody), owrzodzenie jelit, krwawienia wewnętrzne, bóle brzucha o nieustalonej przyczynie, niewyjaśnione dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Nie stosować u dzieci do 12 roku życia, u dzieci starszych tylko w porozumieniu z lekarzem.

Interakcje: lek wzmacnia działanie olejków lotnych. Ostre przyprawy nasilają jego drażniące działanie.

Działania niepożądane: nawet w dawkach leczniczych drażni jelito cienkie, następuje przekrwienie narządów jamy brzusznej i miednicy mniejszej, co może być przyczyną zaostrzenia istniejących stanów zapalnych. Dłuższe stosowanie powoduje dolegliwości żołądkowo-jelitowe, brak apetytu i utratę elektrolitów (potas).

Ciąża i okres karmienia piersią: nie należy stosować w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Wpływ na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn w ruchu: nie wywiera wpływu.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem: lek może być stosowany sporadycznie. Systematyczne stosowanie powoduje silne podrażnienie przewodu pokarmowego. Jeżeli zaparcie utrzymuje się mimo jednorazowego przyjęcia leku lub pojawią się inne dolegliwości należy skontaktować się z lekarzem.

Sposób stosowania i droga podania: doustnie, dorośli 5 -10g (½ -1 łyżka) jednorazowo. Przeczyszczenie następuje po 2-6 godzinach.

Przechowywanie: przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Warunki przechowywania: w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 25°C. Nie stosować po upływie terminu ważności.

Wydaje się bez recepty

Nr serii:

Termin ważności : (miesiąc, rok)

Nr pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:

Kod EAN UCC: 590 999 001 177 3

Podmiot odpowiedzialny: PPH MICROFARM
Kacperski i wspólnicy Spółka jawna
os. H. Sienkiewicza 33
32-080 Zabierzów
tel./fax 12 656 62 35

Data zatwierdzenia tekstu:

Butelka ze szkła barwnego z zakrętką polietylenową a 500g – tekst proponowany

Olej rycynowy

Oleum Ricini FP

Skład: 100g zawiera 100g Oleum Ricini

Zawartość: 500g

Działanie: silnie drażniące ściany jelit, nasilające ruchy perystaltyczne jelita cienkiego

Wskazania do stosowania: doraźnie w zaparciu. Nie stosować przez czas dłuższy (kilka dni)

Przeciwwskazania: niedrożność jelit, zapalenie wyrostka robaczkowego, stany zapalne w obrębie jamy brzusznej i miednicy mniejszej u kobiet (macica, jajniki, jajowody), owrzodzenie jelit, krwawienia wewnętrzne, bóle brzucha o nieustalonej przyczynie, niewyjaśnione dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Nie stosować u dzieci do 12 roku życia, u dzieci starszych tylko w porozumieniu z lekarzem.

Interakcje: lek wzmacnia działanie olejków lotnych. Ostre przyprawy nasilają jego drażniące działanie.

Działania niepożądane: nawet w dawkach leczniczych drażni jelito cienkie, następuje przekrwienie narządów jamy brzusznej i miednicy mniejszej, co może być przyczyną zaostrzenia istniejących stanów zapalnych. Dłuższe stosowanie powoduje dolegliwości żołądkowo-jelitowe, brak apetytu i utratę elektrolitów (potas).

Ciąża i okres karmienia piersią: nie należy stosować w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Wpływ na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn w ruchu: nie wywiera wpływu.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem: lek może być stosowany sporadycznie. Systematyczne stosowanie powoduje silne podrażnienie przewodu pokarmowego. Jeżeli zaparcie utrzymuje się mimo jednorazowego przyjęcia leku lub pojawią się inne dolegliwości należy skontaktować się z lekarzem.

Sposób stosowania i droga podania: doustnie, dorośli 5 -10g (½ -1 łyżka) jednorazowo. Przeczyszczenie następuje po 2-6 godzinach.

Przechowywanie: przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Warunki przechowywania: w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 25°C. Nie stosować po upływie terminu ważności.

Wydaje się bez recepty

Nr serii:

Termin ważności : (miesiąc, rok)

Nr pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:

Kod EAN UCC: 590 999 001 178 0

Podmiot odpowiedzialny: PPH MICROFARM
Kacperski i wspólnicy Spółka jawna
os. H. Sienkiewicza 33
32-080 Zabierzów
tel./fax 12 656 62 35

Data zatwierdzenia tekstu: