

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

Torebka papierowa laminowana 50 g

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

GLUKOZA

Glucosum anhydricum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Skład Glukoza

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

proszek doustny

proszek do sporządzania roztworu doustnego

Kod EAN 5909994111714

50 g

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Należy zapoznać się z treścią etykiety przed zastosowaniem leku.

Sposób i droga podania

Lek stosuje się doustnie bezpośrednio lub po rozpuszczeniu w wodzie.

Doraźnie w stanach hipoglikemii przyjąć łyżeczkę do kilku łyżeczek glukozy (5 g - 20 g). W celu wykonania doustnego testu tolerancji glukozy postępować według wskazań lekarza.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W cukrzycy stosowanie glukozy może odbywać się wyłącznie według zaleceń lekarza.

Przeciwwskazania

Zespół złego wchłaniania glukozy, galaktozy.

Ciąża lub laktacja

Brak przeciwwskazań do stosowania podczas ciąży lub laktacji.

Możliwe działania niepożądane

Przyjęcie jednorazowo dużej ilości glukozy może spowodować nudności i wymioty.

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione na opakowaniu, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: tel.: 22 49 21 301, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Warunki przechowywania

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny

PPF HASCO-LEK S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

tel. 22 742 00 22, e-mail: informacjaoleku@hasco-lek.pl

{Logo podmiotu odpowiedzialnego}

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr IL-1117/ChF

13. NUMER SERII

Numer serii

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC – Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Działanie

Glukoza jest źródłem energii i cukrem niezbędnym dla funkcjonowania człowieka. Po podaniu doustnym glukoza łatwo się wchłania z przewodu pokarmowego, jest metabolizowana w tkankach i częściowo odkłada się w wątrobie w postaci glikogenu. Działa również moczopędnie.

Wskazania do stosowania

Hipoglikemia (np. po przedawkowaniu insuliny).

Poza tym według wskazań lekarskich (np. w celu wykonania doustnego testu tolerancji glukozy).

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

glukoza

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

Torebka papierowa laminowana 75 g

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

GLUKOZA

Glucosum anhydricum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Skład Glukoza

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

proszek doustny
proszek do sporządzania roztworu doustnego

kod EAN 5904055003724

75 g

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Należy zapoznać się z treścią etykiety przed zastosowaniem leku.

Sposób i droga podania

Lek stosuje się doustnie bezpośrednio lub po rozpuszczeniu w wodzie.

Doraźnie w stanach hipoglikemii przyjąć łyżeczkę do kilku łyżeczek glukozy (5 g - 20 g). W celu wykonania doustnego testu tolerancji glukozy postępować według wskazań lekarza.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W cukrzycy stosowanie glukozy może odbywać się wyłącznie według zaleceń lekarza.

Przeciwwskazania

Zespół złego wchłaniania glukozy, galaktozy.

Ciąża lub laktacja

Brak przeciwwskazań do stosowania podczas ciąży lub laktacji.

Możliwe działania niepożądane

Przyjęcie jednorazowo dużej ilości glukozy może spowodować nudności i wymioty.

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione na opakowaniu, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: tel.: 22 49 21 301, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Warunki przechowywania

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny

PPF HASCO-LEK S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

tel. 22 742 00 22, e-mail: informacjaoleku@hasco-lek.pl

{Logo podmiotu odpowiedzialnego}

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr IL-1117/ChF

13. NUMER SERII

Numer serii

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC – Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Działanie

Glukoza jest źródłem energii i cukrem niezbędnym dla funkcjonowania człowieka. Po podaniu doustnym glukoza łatwo się wchłania z przewodu pokarmowego, jest metabolizowana w tkankach i częściowo odkłada się w wątrobie w postaci glikogenu. Działa również moczopędnie.

Wskazania do stosowania

Hipoglikemia (np. po przedawkowaniu insuliny).

Poza tym według wskazań lekarskich (np. w celu wykonania doustnego testu tolerancji glukozy).

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

glukoza

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

Torebka papierowa laminowana 80 g

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

GLUKOZA

Glucosum anhydricum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Skład Glukoza

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

proszek doustny
proszek do sporządzania roztworu doustnego

Kod EAN 5909994111721

80 g

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Należy zapoznać się z treścią etykiety przed zastosowaniem leku.

Sposób i droga podania

Lek stosuje się doustnie bezpośrednio lub po rozpuszczeniu w wodzie.

Doraźnie w stanach hipoglikemii przyjąć łyżeczkę do kilku łyżeczek glukozy (5 g - 20 g). W celu wykonania doustnego testu tolerancji glukozy postępować według wskazań lekarza.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W cukrzycy stosowanie glukozy może odbywać się wyłącznie według zaleceń lekarza.

Przeciwwskazania

Zespół złego wchłaniania glukozy, galaktozy.

Ciąża lub laktacja

Brak przeciwwskazań do stosowania podczas ciąży lub laktacji.

Możliwe działania niepożądane

Przyjęcie jednorazowo dużej ilości glukozy może spowodować nudności i wymioty.

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione na opakowaniu, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: tel.: 22 49 21 301, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Warunki przechowywania

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny

PPF HASCO-LEK S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

tel. 22 742 00 22, e-mail: informacjaoleku@hasco-lek.pl

{Logo podmiotu odpowiedzialnego}

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr IL-1117/ChF

13. NUMER SERII

Numer serii

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC – Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Działanie

Glukoza jest źródłem energii i cukrem niezbędnym dla funkcjonowania człowieka. Po podaniu doustnym glukoza łatwo się wchłania z przewodu pokarmowego, jest metabolizowana w tkankach i częściowo odkłada się w wątrobie w postaci glikogenu. Działa również moczopędnie.

Wskazania do stosowania

Hipoglikemia (np. po przedawkowaniu insuliny).

Poza tym według wskazań lekarskich (np. w celu wykonania doustnego testu tolerancji glukozy).

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

glukoza

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

Słoik zamykany wieczkiem zatrzaskowym 80 g

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

GLUKOZA

Glucosum anhydricum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Skład Glukoza

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

proszek doustny
proszek do sporządzania roztworu doustnego

Kod EAN 5909990035830

80 g

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Odklej w celu uzyskania informacji o leku

Należy zapoznać się z treścią etykiety przed zastosowaniem leku.

Sposób i droga podania

Lek stosuje się doustnie bezpośrednio lub po rozpuszczeniu w wodzie.

Doraźnie w stanach hipoglikemii przyjąć łyżeczkę do kilku łyżeczek glukozy (5 g - 20 g). W celu wykonania doustnego testu tolerancji glukozy postępować według wskazań lekarza.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W cukrzycy stosowanie glukozy może odbywać się wyłącznie według zaleceń lekarza.

Przeciwwskazania

Zespół złego wchłaniania glukozy, galaktozy.

Ciąża lub laktacja

Brak przeciwwskazań do stosowania podczas ciąży lub laktacji.

Możliwe działania niepożądane

Przyjęcie jednorazowo dużej ilości glukozy może spowodować nudności i wymioty.

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione na opakowaniu, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: tel.: 22 49 21 301, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Warunki przechowywania

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny

PPF HASCO-LEK S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

tel. 22 742 00 22, e-mail: informacjaoleku@hasco-lek.pl

{Logo podmiotu odpowiedzialnego}

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr IL-1117/ChF

13. NUMER SERII

Numer serii

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC – Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Działanie

Glukoza jest źródłem energii i cukrem niezbędnym dla funkcjonowania człowieka. Po podaniu doustnym glukoza łatwo się wchłania z przewodu pokarmowego, jest metabolizowana w tkankach i częściowo odkłada się w wątrobie w postaci glikogenu. Działa również moczopędnie.

Wskazania do stosowania

Hipoglikemia (np. po przedawkowaniu insuliny).

Poza tym według wskazań lekarskich (np. w celu wykonania doustnego testu tolerancji glukozy).

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

glukoza

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

Torebka papierowa laminowana 100 g

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

GLUKOZA

Glucosum anhydricum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Skład Glukoza

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

proszek doustny

proszek do sporządzania roztworu doustnego

Kod EAN 5909994111738

100 g

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Należy zapoznać się z treścią etykiety przed zastosowaniem leku.

Sposób i droga podania

Lek stosuje się doustnie bezpośrednio lub po rozpuszczeniu w wodzie.

Doraźnie w stanach hipoglikemii przyjąć łyżeczkę do kilku łyżeczek glukozy (5 g - 20 g). W celu wykonania doustnego testu tolerancji glukozy postępować według wskazań lekarza.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W cukrzycy stosowanie glukozy może odbywać się wyłącznie według zaleceń lekarza.

Przeciwwskazania

Zespół złego wchłaniania glukozy, galaktozy.

Ciąża lub laktacja

Brak przeciwwskazań do stosowania podczas ciąży lub laktacji.

Możliwe działania niepożądane

Przyjęcie jednorazowo dużej ilości glukozy może spowodować nudności i wymioty.

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione na opakowaniu, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: tel.: 22 49 21 301, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Warunki przechowywania

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny

PPF HASCO-LEK S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

tel. 22 742 00 22, e-mail: informacjaoleku@hasco-lek.pl

{Logo podmiotu odpowiedzialnego}

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr IL-1117/ChF

13. NUMER SERII

Numer serii

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC – Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Działanie

Glukoza jest źródłem energii i cukrem niezbędnym dla funkcjonowania człowieka. Po podaniu doustnym glukoza łatwo się wchłania z przewodu pokarmowego, jest metabolizowana w tkankach i częściowo odkłada się w wątrobie w postaci glikogenu. Działa również moczopędnie.

Wskazania do stosowania

Hipoglikemia (np. po przedawkowaniu insuliny).

Poza tym według wskazań lekarskich (np. w celu wykonania doustnego testu tolerancji glukozy).

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

glukoza

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

Worek z folii polietylenowej 1000 g

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

GLUKOZA

Glucosum anhydricum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJK

Skład Glukoza

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

proszek doustny

proszek do sporządzania roztworu doustnego

Kod EAN 5909994111745

1000 g

Opakowanie przeznaczone do użycia w lecznictwie zamkniętym.

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Odklej w celu uzyskania informacji o leku

Należy zapoznać się z treścią etykiety przed zastosowaniem leku.

Sposób i droga podania

Lek stosuje się doustnie bezpośrednio lub po rozpuszczeniu w wodzie.

Doraźnie w stanach hipoglikemii przyjąć łyżeczkę do kilku łyżeczek glukozy (5 g - 20 g). W celu wykonania doustnego testu tolerancji glukozy postępować według wskazań lekarza.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W cukrzycy stosowanie glukozy może odbywać się wyłącznie według zaleceń lekarza.

Przeciwwskazania

Zespół złego wchłaniania glukozy, galaktozy.

Ciąża lub laktacja

Brak przeciwwskazań do stosowania podczas ciąży lub laktacji.

Możliwe działania niepożądane

Przyjęcie jednorazowo dużej ilości glukozy może spowodować nudności i wymioty.

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione na opakowaniu, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: tel.: 22 49 21 301, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Warunki przechowywania

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny

PPF HASCO-LEK S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

tel. 22 742 00 22, e-mail: informacjaoleku@hasco-lek.pl

{Logo podmiotu odpowiedzialnego}

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr IL-1117/ChF

13. NUMER SERII

Numer serii

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC – Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Działanie

Glukoza jest źródłem energii i cukrem niezbędnym dla funkcjonowania człowieka. Po podaniu doustnym glukoza łatwo się wchłania z przewodu pokarmowego, jest metabolizowana w tkankach i częściowo odkłada się w wątrobie w postaci glikogenu. Działa również moczopędnie.

Wskazania do stosowania

Hipoglikemia (np. po przedawkowaniu insuliny).

Poza tym według wskazań lekarskich (np. w celu wykonania doustnego testu tolerancji glukozy).

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

glukoza

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.