

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Ostrzeżenia: Nie należy stosować leku Orofar Junior w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek z jego składników, u osób z tendencją do zachłyśnięć, zwłaszcza w wieku powyżej 60 lat, u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności:

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. Chronić przed wilgocią.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
61118 Bad Vilbel
Niemcy
(logo podmiotu odpowiedzialnego)

12. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 9897

13. NUMER SERII

Nr serii:

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - lek wydawany bez recepty

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

smak pomarańczowy

Dla dzieci w wieku powyżej 6 lat.

Łagodzi ból gardła w przeziębieniu, zapaleniu gardła, zapaleniu krtani.

Działa przeciwbólowo, przeciwbakteryjnie, przeciwwirusowo, przeciwgrzybiczo.

Lidokaina zawarta w leku działa miejscowo znieczulająco, zmniejsza ból, ułatwia przełykanie.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Orofar Junior tabletki