

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

Pudełko kartonowe

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Orofar Total Action

(2 mg + 1,5 mg)/ml, aerozol do stosowania w jamie ustnej

Benzoxonii chloridum + Lidocaini hydrochloridum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)

Skład:

Jeden ml roztworu zawiera 2 mg benzoksoniowego chlorku i 1,5 mg lidokainy chlorowodorku

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

oraz substancje pomocnicze: etanol 96% v/v, glicerol, olejki miętowy, mentol, kwas solny 0,1N, woda oczyszczona.

Jedna dawka zawiera 0,2798 mg benzoksoniowego chlorku i 0,2098 mg lidokainy chlorowodorku.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

30 ml aerozolu do stosowania w jamie ustnej

Kod EAN: 5909990933310

5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA

Sposób stosowania:

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności:

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny:
STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
61118 Bad Vilbel
Niemcy
(logo podmiotu odpowiedzialnego)

12. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 9333

13. NUMER SERII

Nr serii:

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC – lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

- **Leczenie bólu gardła** i infekcji jamy ustnej
- **Właściwości antyseptyczne** (bakteriobójcze, przeciwwirusowe i przeciwgrzybicze)

Orofar Total Action stosuje się:

- w zakażeniach gardła
- w zakażeniach jamy ustnej (stany zapalne dziąseł, zakażenia i owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej - afty).

Zmniejsza ból gardła towarzyszący przeziębieniom, zapaleniu gardła, zapaleniu krtani.

Pomocniczo może być stosowany w leczeniu zapalenia migdałków (angina).

Orofar Total Action zapobiega tworzeniu się bakteryjnej płytki nazębnej. Działa przeciwbólowo, przeciwbakteryjnie, przeciwwirusowo, przeciwgrzybiczo.

Lidokaina zawarta w leku działa miejscowo znieczulająco, zmniejsza ból, ułatwia przełykanie.

Dawkowanie:

Orofar Total Action aerozol rozpylać w jamie ustnej lub na tylną ścianę gardła trzy do sześciu razy dziennie. Trzymając pojemnik pionowo rozpylić cztery razy przy każdym użyciu.

U dzieci powyżej 6 lat przy każdym użyciu rozpylać dwa – trzy razy.

Ostrzeżenia:

Nie należy stosować leku Orofar Total Action w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników tego leku, u osób z tendencją do zachłystywania, zwłaszcza w wieku powyżej 60 lat, u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Orofar Total Action aerozol

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR -KOD 2D

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR -DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA
--

Nie dotyczy.

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH
BEZPOŚREDNICH**

Butelka

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA(I) PODANIA

Orofar Total Action (2 mg + 1,5 mg)/ml, aerozol do stosowania w jamie ustnej
Benzoxonii chloridum + Lidocaini hydrochloridum

2. SPOSÓB PODAWANIA

Wskazania i dawkowanie zgodnie z załączoną ulotką informacyjną.

3. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności:

4. NUMER SERII

Numer serii:

**5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY
JEDNOSTEK**

30 ml

6. INNE

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

/logo/
STADA Arzneimittel AG