

**INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH
{PUDEŁKO TEKTUROWE}**

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Oscillococcinum, granulki w pojemniku jednodawkowym
Homeopatyczny produkt leczniczy.

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Skład

1 g granulek zawiera:

Substancja czynna: 0,01 ml Anas barbariae hepatis et cordis extractum 200K.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: sacharoza, laktoza jednowodna. Dodatkowe informacje - patrz ulotka.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Granulki w pojemniku jednodawkowym

Zawartość opakowania:

6 pojemników jednodawkowych	kod: 590999 0022380
12 pojemników jednodawkowych	kod: 590999 0641673
18 pojemników jednodawkowych	kod: 590999 0649938
24 pojemniki jednodawkowe	kod: 590999 0641680
30 pojemników jednodawkowych.	kod: 590999 0935291

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doustne.

Zawartość tubki rozpuścić w ustach, trzymając granulki pod językiem.

Młodszym dzieciom (do ukończenia 2. roku życia) granulki należy rozpuścić w niewielkiej ilości wody i podawać łyżeczką.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

**6. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU
LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA
DZIECI**

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP *oznaczenie wraz z datą będą dodrukowane podczas produkcji*

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Brak specjalnych warunków przechowywania.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny
BOIRON SA
2 avenue de l'Ouest Lyonnais
69510 Messimy - Francja

<logo podmiotu odpowiedzialnego>

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: IL-2965/LN-H

13. NUMER SERII

LOT *oznaczenie wraz z numerem będą dodrukowane podczas produkcji*

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC – lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Profilaktyka przeziębień
Objawy grypy, przeziębienia i infekcji grypopodobnych

piktogram 6 dawek
piktogram 30 dawek

piktogram 12 dawek
piktogram 18 dawek

piktogram 24 dawki

Wskazania do stosowania

Objawy grypy, przeziębienia i infekcji grypopodobnych: gorączka (do 38,5°C), uczucie ogólnego rozbicia, bóle mięśniowe i kostno-stawowe. Oscilloccinum zaleca się stosować zaraz po wystąpieniu pierwszych objawów infekcji między innymi, takich jak: uczucie drapania w gardle, uczucie rozbicia, uczucie zimna. W okresie zwiększonej zachorowalności na przeziębienia podanie leku 1 raz na tydzień może zmniejszyć ilość zachorowań.

Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli, młodzież i dzieci po ukończeniu 1. roku życia:

Profilaktyka (leczenie zapobiegawcze): w okresie zwiększonej zachorowalności przyjmować 1 dawkę leku raz na tydzień.

Początek infekcji: zażyć 1 dawkę leku jak najwcześniej, w razie potrzeby powtórzyć 2 do 3 razy co 6 godzin.

Rozwinięta infekcja: 1 dawka leku rano i wieczorem przez 3 dni.

Jeżeli po 3 dniach leczenia nie nastąpiła poprawa lub objawy nasilają się, należy skonsultować się z lekarzem. W profilaktyce lek można stosować do 6 miesięcy.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

oscillococcinum

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D
--

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.